

死因摘要表目錄

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

表1 主要死亡原因

民國109年

順位	合 計						男 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
	A00-Y98	所有死亡原因	173,067	733.9	390.8	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	101,385	867.3	511.0	
1	C00-C97	惡性腫瘤	50,161	212.7	117.3	29.0	C00-C97	惡性腫瘤	30,250	258.8	152.6	
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除 外)	20,457	86.7	43.8	11.8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除 外)	11,809	101.0	57.9	
3	J12-J18	肺炎	13,736	58.2	26.4	7.9	J12-J18	肺炎	8,220	70.3	36.5	
4	I60-I69	腦血管疾病	11,821	50.1	25.2	6.8	I60-I69	腦血管疾病	6,933	59.3	33.7	
5	E10-E14	糖尿病	10,311	43.7	22.0	6.0	E10-E14	糖尿病	5,260	45.0	25.6	
6	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	6,767	28.7	20.3	3.9	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	4,743	40.6	29.9	
7	I10-I15	高血壓性疾病	6,706	28.4	13.4	3.9	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	4,097	35.0	18.2	
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	5,657	24.0	11.0	3.3	I10-I15	高血壓性疾病	3,410	29.2	16.0	
9	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,096	21.6	10.5	2.9	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	2,872	24.6	16.3	
10	K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	3,964	16.8	10.3	2.3	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	2,549	21.8	12.0	
		其他	38,391	162.8	90.6	22.2		其他	21,242	181.7	112.3	
11	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	3,656	15.5	11.8	2.1	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	2,404	20.6	15.6	
12	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	2,885	12.2	5.0	1.7	F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	1,267	10.8	5.2	
13	R54	衰老/老邁	2,385	10.1	4.0	1.4	R54	衰老/老邁	1,061	9.1	4.2	
14	A40-A41	敗血症	1,931	8.2	4.0	1.1	A40-A41	敗血症	1,016	8.7	4.8	
15	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤 除外)	1,514	6.4	3.2	0.9	D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤 除外)	860	7.4	4.1	

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人

2. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

單位：人、每十萬人口、%

死亡人數 結構比 %	女		性			死亡人數 結構比 %
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		
				死亡率	標準化 死亡率	
100.0	A00-Y98	所有死亡原因	71,682	602.7	284.3	100.0
29.8	C00-C97	惡性腫瘤	19,911	167.4	86.7	27.8
11.6	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30- I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	8,648	72.7	31.0	12.1
8.1	J12-J18	肺炎	5,516	46.4	18.1	7.7
6.8	E10-E14	糖尿病	5,051	42.5	18.6	7.0
5.2	I60-I69	腦血管疾病	4,888	41.1	17.9	6.8
4.7	I10-I15	高血壓性 疾病	3,296	27.7	11.0	4.6
4.0	N00-N07, N17- N19, N25-N27	腎炎、腎病 症候群及腎病變	2,547	21.4	9.2	3.6
3.4	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	2,024	17.0	11.1	2.8
2.8	F01-F03	血管性及未明 示之癡呆症	1,618	13.6	4.9	2.3
2.5	J40-J47	慢性下呼吸 道疾病	1,560	13.1	5.3	2.2
21.0		其他	16,623	139.8	70.6	23.2
2.4	R54	衰老/老邁	1,324	11.1	3.8	1.8
1.2	X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷 害(自殺)	1,252	10.5	8.3	1.7
1.0	K70, K73-K74	慢性肝病及 肝硬化	1,092	9.2	4.6	1.5
1.0	A40-A41	敗血症	915	7.7	3.4	1.3
0.8	M00-M99	骨骼肌肉系 統及結締組織 之疾病	671	5.6	2.8	0.9

表2 嬰兒主要死亡原因

民國109年

順位	合計					男 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	死亡率	死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	死亡率	
	A00-Y98	所有死亡原因	586	363.3	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	333	397.6	
1	Q00-Q99	先天性畸形、變形及染色體異常	105	65.1	17.9	Q00-Q99	先天性畸形、變形及染色體異常	63	75.2	
2	P05-P08	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	79	49.0	13.5	P20-P28	源於周產期的呼吸性疾患	45	53.7	
3	P20-P28	源於周產期的呼吸性疾患	76	47.1	13.0	P05-P08	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	40	47.8	
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	39	24.2	6.7	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	22	26.3	
5	P35-P39	特發於周產期的感染	29	18.0	4.9	P35-P39	特發於周產期的感染	12	14.3	
6	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	23	14.3	3.9	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	11	13.1	
7	P00-P04	母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	19	11.8	3.2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性心臟病除外)	9	10.7	
8	P50-P61	胎兒及新生兒出血及血液疾患	18	11.2	3.1	J12-J18	肺炎	9	10.7	
9	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性心臟病除外)	11	6.8	1.9	P00-P04	母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	8	9.6	
10	J12-J18	肺炎	11	6.8	1.9	P50-P61	胎兒及新生兒出血及血液疾患	8	9.6	
		其他	176	109.1	30.0		其他	106	126.6	

附註：109年出生數計161,288人，男性83,748人，女性77,540人。

單位：人、每十萬活產、%

死亡人數 結構比 %	女 性		死亡 人數	死亡率	死亡人數 結構比 %
	ICD-10 國際死因 分類碼	死亡原因			
100.0	A00-Y98	所有死亡原因	253	326.3	100.0
18.9	Q00-Q99	先天性畸形、變形及染色體異常	42	54.2	16.6
13.5	P05-P08	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	39	50.3	15.4
12.0	P20-P28	源於周產期的呼吸性疾患	31	40.0	12.3
6.6	P35-P39	特發於周產期的感染	17	21.9	6.7
3.6	V01-X59, Y85- Y86	事故傷害	17	21.9	6.7
3.3	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	12	15.5	4.7
2.7	P00-P04	母體因素及懷孕、分娩、生產之併 發症所影響之胎兒及新生兒	11	14.2	4.3
2.7	P50-P61	胎兒及新生兒出血及血液疾患	10	12.9	4.0
2.4	X85-Y09, Y87.1	加害(他殺)	5	6.4	2.0
2.4	A40-A41	敗血症	2	2.6	0.8
31.8		其他	67	86.4	26.5

表3 主要癌症死亡原因

民國109年

順位	合計						男 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	50,161	212.7	117.3	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	30,250	258.8	152.6	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	9,629	40.8	21.8	19.2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	6,037	51.6	29.7	20.0
3	C22	肝和肝內膽管癌	7,773	33.0	18.0	15.5	C22	肝和肝內膽管癌	5,296	45.3	26.8	17.5
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	6,489	27.5	14.6	12.9	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3,636	31.1	17.9	12.0
5	C50	女性乳癌	2,655	22.3	12.8 (1)	5.3	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3,137	26.8	16.8	10.4
6	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,730	14.8	7.8 (2)	3.4	C15	食道癌	1,801	15.4	9.5	6.0
7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	3,380	14.3	8.6	6.7	C61	前列腺(攝護腺)癌	1,730	14.8	7.8	5.7
8	C25	胰臟癌	2,450	10.4	5.7	4.9	C16	胃癌	1,433	12.3	6.9	4.7
9	C16	胃癌	2,339	9.9	5.2	4.7	C25	胰臟癌	1,349	11.5	6.8	4.5
10	C15	食道癌	1,954	8.3	4.9	3.9	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	748	6.4	3.8	2.5
	C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	724	6.1	3.6 (1)	1.4	C91-C95	白血病	717	6.1	3.9	2.4
		其他	11,038	46.8	26.5	22.0		其他	4,366	37.3	22.6	14.4
11	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	668	5.6	3.1 (1)	1.3	C67	膀胱癌	712	6.1	3.3	2.4
12	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	1,294	5.5	3.0	2.6	C11	鼻咽癌	487	4.2	2.6	1.6
13	C91-C95	白血病	1,176	5.0	3.0	2.3	C71	腦癌	360	3.1	2.1	1.2
14	C67	膀胱癌	1,065	4.5	2.2	2.1	C64	腎臟癌	334	2.9	1.7	1.1
15	C54	子宮體癌	444	3.7	2.2 (1)	0.9	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	312	2.7	1.6	1.0

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179 人，男性 11,689,476，女性 11,892,703 人

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。

單位：人、每十萬人口、%

		性			
ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
			死亡率	標準化 死亡率	
C00-C97	惡性腫瘤	19,911	167.4	86.7	100.0
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	3,592	30.2	15.1	18.0
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2,853	24.0	11.8	14.3
C50	女性乳癌	2,655	22.3	12.8	13.3
C22	肝和肝內膽管癌	2,477	20.8	10.0	12.4
C25	胰臟癌	1,101	9.3	4.7	5.5
C16	胃癌	906	7.6	3.8	4.6
C56, C57.0- C57.4	卵巢癌	724	6.1	3.6	3.6
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	668	5.6	3.1	3.4
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	546	4.6	2.3	2.7
C91-C95	白血病	459	3.9	2.2	2.3
	其他	3,930	33.0	17.3	19.7
C54	子宮體癌	444	3.7	2.2	2.2
C67	膀胱癌	353	3.0	1.3	1.8
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	314	2.6	1.3	1.6
C71	腦癌	270	2.3	1.4	1.4
C45-C49	間皮和軟組織癌	247	2.1	1.2	1.2

表4 主要死亡原因—與上年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	民國109年					民國108		
		順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死亡 人數	每十 萬
				死亡率	標準化 死亡率				
A00-Y98	所有死亡原因		173,067	733.9	390.8	100.0		175,424	743.4
C00-C97	惡性腫瘤	1	50,161	212.7	117.3	29.0	1	50,232	212.9
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	2	20,457	86.7	43.8	11.8	2	19,859	84.2
J12-J18	肺炎	3	13,736	58.2	26.4	7.9	3	15,185	64.4
I60-I69	腦血管疾病	4	11,821	50.1	25.2	6.8	4	12,176	51.6
E10-E14	糖尿病	5	10,311	43.7	22.0	6.0	5	9,996	42.4
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	6,767	28.7	20.3	3.9	6	6,640	28.1
I10-I15	高血壓性疾病	7	6,706	28.4	13.4	3.9	8	6,255	26.5
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	8	5,657	24.0	11.0	3.3	7	6,301	26.7
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	9	5,096	21.6	10.5	2.9	9	5,049	21.4
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	10	3,964	16.8	10.3	2.3	10	4,240	18.0
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	11	3,656	15.5	11.8	2.1	11	3,864	16.4
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	12	2,885	12.2	5.0	1.7	13	2,625	11.1
R54	衰老/老邁	13	2,385	10.1	4.0	1.4	14	2,199	9.3
A40-A41	敗血症	14	1,931	8.2	4.0	1.1	12	2,925	12.4
D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)	15	1,514	6.4	3.2	0.9	15	1,447	6.1

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人

2. 108年年中人口數計 23,596,027人，男性 11,709,050，女性 11,886,977人

3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

單位：人、每十萬人口、%

年		死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減 百分比	
总人口	死亡人數 結構比 %	增減 百分比	每十萬人 口增減數	增減 百分比	每十萬人 口增減數		
	408.2	100.0	-1.3	-9.6	-4.3	-17.4	-1.3
	121.3	28.6	-0.1	-0.2	-3.3	-4.0	-0.1
	43.6	11.3	3.1	2.6	0.4	0.2	3.0
	30.0	8.7	-9.5	-6.1	-12.1	-3.6	-9.5
	26.7	6.9	-2.9	-1.5	-5.4	-1.4	-2.9
	22.3	5.7	3.2	1.4	-1.1	-0.3	3.2
	20.0	3.8	2.0	0.6	1.1	0.2	1.9
	12.9	3.6	7.3	1.9	3.9	0.5	7.2
	12.6	3.6	-10.2	-2.7	-12.6	-1.6	-10.2
	10.7	2.9	1.0	0.2	-2.3	-0.3	0.9
	11.2	2.4	-6.5	-1.2	-7.8	-0.9	-6.5
	12.6	2.2	-5.3	-0.9	-5.9	-0.7	-5.4
	4.7	1.5	10.0	1.1	6.4	0.3	9.9
	3.9	1.3	8.5	0.8	3.8	0.1	8.5
	6.1	1.7	-33.9	-4.2	-34.2	-2.1	-34.0
	3.3	0.8	4.7	0.3	-1.5	-0.0	4.6

表5 男性主要死亡原因－與上年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	民國109年					民國108		
		順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死亡 人數	每十 萬 死亡率
				死亡率	標準化 死亡率				
A00-Y98	所有死亡原因		101,385	867.3	511.0	100.0		103,004	879.7
C00-C97	惡性腫瘤	1	30,250	258.8	152.6	29.8	1	30,543	260.8
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	2	11,809	101.0	57.9	11.6	2	11,375	97.1
J12-J18	肺炎	3	8,220	70.3	36.5	8.1	3	8,935	76.3
I60-I69	腦血管疾病	4	6,933	59.3	33.7	6.8	4	7,009	59.9
E10-E14	糖尿病	5	5,260	45.0	25.6	5.2	5	5,044	43.1
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	6	4,743	40.6	29.9	4.7	6	4,701	40.1
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	7	4,097	35.0	18.2	4.0	7	4,546	38.8
I10-I15	高血壓性疾病	8	3,410	29.2	16.0	3.4	8	3,104	26.5
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	9	2,872	24.6	16.3	2.8	9	3,011	25.7
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	10	2,549	21.8	12.0	2.5	10	2,583	22.1
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	11	2,404	20.6	15.6	2.4	11	2,554	21.8
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	12	1,267	10.8	5.2	1.2	13	1,178	10.1
R54	衰老/老邁	13	1,061	9.1	4.2	1.0	14	1,015	8.7
A40-A41	敗血症	14	1,016	8.7	4.8	1.0	12	1,642	14.0
D00-D48	原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)	15	860	7.4	4.1	0.8	15	814	7.0

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人, 男性 11,689,476, 女性 11,892,703人
 2. 108年年中人口數計 23,596,027人, 男性 11,709,050, 女性 11,886,977人
 3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

單位：人、每十萬人口、%

年		死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減 百分比
萬人口	死亡人數	增減 百分比	每十萬人 口增減數	增減 百分比	每十萬人 口增減數	
標準化 死亡率	結構比 %					
531.7	100.0	-1.4	-12.4	-3.9	-20.7	-1.6
158.8	29.7	-0.8	-2.1	-3.9	-6.2	-1.0
56.9	11.0	4.0	3.9	1.6	0.9	3.8
40.4	8.7	-7.8	-6.0	-9.5	-3.8	-8.0
34.7	6.8	-0.9	-0.5	-3.1	-1.1	-1.1
25.4	4.9	4.5	1.9	0.9	0.2	4.3
30.0	4.6	1.1	0.4	-0.3	-0.1	0.9
20.6	4.4	-9.7	-3.8	-11.6	-2.4	-9.9
14.9	3.0	10.0	2.7	7.7	1.1	9.9
17.3	2.9	-4.5	-1.1	-5.9	-1.0	-4.6
12.4	2.5	-1.2	-0.3	-3.6	-0.5	-1.3
16.9	2.5	-5.7	-1.2	-8.0	-1.4	-5.9
4.9	1.1	7.7	0.8	5.1	0.2	7.6
4.2	1.0	4.7	0.4	1.6	0.1	4.5
7.8	1.6	-38.0	-5.3	-38.4	-3.0	-38.1
4.0	0.8	5.8	0.4	1.1	0.0	5.7

表6 女性主要死亡原因－與上年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	民國109年					民國108		
		順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死亡 人數	每十 萬
				死亡率	標準化 死亡率				
A00-Y98	所有死亡原因		71,682	602.7	284.3	100.0		72,420	609.2
C00-C97	惡性腫瘤	1	19,911	167.4	86.7	27.8	1	19,689	165.6
I01-I02.0, I05-I09, I20- I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性疾病除外)	2	8,648	72.7	31.0	12.1	2	8,484	71.4
J12-J18	肺炎	3	5,516	46.4	18.1	7.7	3	6,250	52.6
E10-E14	糖尿病	4	5,051	42.5	18.6	7.0	5	4,952	41.7
I60-I69	腦血管疾病	5	4,888	41.1	17.9	6.8	4	5,167	43.5
I10-I15	高血壓性疾病	6	3,296	27.7	11.0	4.6	6	3,151	26.5
N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及腎病變	7	2,547	21.4	9.2	3.6	7	2,466	20.7
V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	8	2,024	17.0	11.1	2.8	8	1,939	16.3
F01-F03	血管性及未明示之癡呆症	9	1,618	13.6	4.9	2.3	10	1,447	12.2
J40-J47	慢性下呼吸道疾病	10	1,560	13.1	5.3	2.2	9	1,755	14.8
R54	衰老/老邁	11	1,324	11.1	3.8	1.8	14	1,184	10.0
X60-X84, Y87.0	蓄意自我傷害 (自殺)	12	1,252	10.5	8.3	1.7	11	1,310	11.0
K70, K73-K74	慢性肝病及肝硬化	13	1,092	9.2	4.6	1.5	13	1,229	10.3
A40-A41	敗血症	14	915	7.7	3.4	1.3	12	1,283	10.8
M00-M99	骨骼肌肉系統及結締組織之疾病	15	671	5.6	2.8	0.9	15	672	5.7

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人
 2. 108年年中人口數計 23,596,027人，男性 11,709,050，女性 11,886,977人
 3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準

單位：人、每十萬人口、%

年		死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減 百分比	
萬人口	死亡人數 結構比 %	增減 百分比	每十萬人 口增減數	增減 百分比	每十萬人 口增減數		
	297.8	100.0	-1.1	-6.5	-4.5	-13.5	-1.0
	88.5	27.2	1.1	1.8	-2.0	-1.8	1.1
	31.4	11.7	1.9	1.3	-1.4	-0.4	1.9
	21.5	8.6	-11.8	-6.2	-15.5	-3.3	-11.7
	19.2	6.8	2.0	0.8	-3.4	-0.7	2.0
	19.5	7.1	-5.4	-2.4	-8.6	-1.7	-5.4
	11.1	4.4	4.6	1.2	-0.7	-0.1	4.6
	9.2	3.4	3.2	0.7	-0.8	-0.1	3.3
	10.5	2.7	4.3	0.7	5.2	0.5	4.4
	4.6	2.0	11.8	1.4	7.3	0.3	11.8
	6.1	2.4	-11.2	-1.6	-13.9	-0.8	-11.1
	3.6	1.6	11.8	1.2	5.9	0.2	11.8
	8.4	1.8	-4.5	-0.5	-0.9	-0.1	-4.4
	5.3	1.7	-11.2	-1.2	-13.0	-0.7	-11.1
	4.7	1.8	-28.7	-3.1	-28.5	-1.3	-28.7
	3.1	0.9	-0.2	-0.0	-8.7	-0.3	-0.1

表7 主要癌症死亡原因－與上年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	民國109年					民國108年			
		順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死亡 人數	每十萬人口	
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率
C00-C97	惡性腫瘤		50,161	212.7	117.3	100.0		50,232	212.9	121.3
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	9,629	40.8	21.8	19.2	1	9,701	41.1	22.8
C22	肝和肝內膽管癌	2	7,773	33.0	18.0	15.5	2	7,881	33.4	18.8
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	6,489	27.5	14.6	12.9	3	6,436	27.3	14.9
C50	女性乳癌	4	2,655	22.3	12.8(1)	5.3	4	2,633	22.2	13.1(1)
C61	前列腺(攝護腺)癌	5	1,730	14.8	7.8(2)	3.4	6	1,538	13.1	7.1(2)
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	6	3,380	14.3	8.6	6.7	5	3,425	14.5	8.9
C25	胰臟癌	7	2,450	10.4	5.7	4.9	7	2,497	10.6	5.9
C16	胃癌	8	2,339	9.9	5.2	4.7	8	2,379	10.1	5.5
C15	食道癌	9	1,954	8.3	4.9	3.9	9	1,983	8.4	5.1
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	10	724	6.1	3.6(1)	1.4	10	683	5.7	3.5(1)
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	11	668	5.6	3.1(1)	1.3	11	674	5.7	3.2(1)
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	12	1,294	5.5	3.0	2.6	12	1,275	5.4	3.0
C91-C95	白血病	13	1,176	5.0	3.0	2.3	13	1,123	4.8	3.0
C67	膀胱癌	14	1,065	4.5	2.2	2.1	14	1,086	4.6	2.3
C54	子宮體癌	15	444	3.7	2.2(1)	0.9	15	392	3.3	1.9(1)

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人
 2. 108年年中人口數計 23,596,027人，男性 11,709,050，女性 11,886,977人
 3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。
 4. (1)每十萬女性人口死亡率；(2)每十萬男性人口死亡率。

單位：人、每十萬人口、%

死亡人數 結構比 %	死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減 百分比
	增減 百分比	每十萬人 口增減數	增減 百分比	每十萬人 口增減數	
100.0	-0.1	-0.2	-3.3	-4.0	-0.1
19.3	-0.7	-0.3	-4.4	-1.0	-0.7
15.7	-1.3	-0.4	-4.6	-0.9	-1.4
12.8	0.9	0.2	-2.2	-0.3	0.8
5.2	0.8	0.2	-2.4	-0.3	0.8
3.1	12.7	1.7	9.9	0.7	12.5
6.8	-1.3	-0.2	-3.8	-0.3	-1.3
5.0	-1.8	-0.2	-4.4	-0.3	-1.9
4.7	-1.6	-0.2	-4.4	-0.2	-1.7
3.9	-1.4	-0.1	-3.3	-0.2	-1.5
1.4	6.0	0.3	5.2	0.2	6.0
1.3	-0.9	-0.1	-4.2	-0.1	-0.9
2.5	1.5	0.1	-1.3	-0.0	1.5
2.2	4.8	0.2	0.2	0.0	4.7
2.2	-1.9	-0.1	-4.8	-0.1	-1.9
0.8	13.2	0.4	12.0	0.2	13.3

表8 男性主要癌症死亡原因—與上年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	民國109年					民國108年			
		順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死亡 人數	每十萬人口	
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率
C00-C97	惡性腫瘤		30,250	258.8	152.6	100.0		30,543	260.8	158.8
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	6,037	51.6	29.7	20.0	1	6,190	52.9	31.6
C22	肝和肝內膽管癌	2	5,296	45.3	26.8	17.5	2	5,363	45.8	28.1
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	3	3,636	31.1	17.9	12.0	3	3,661	31.3	18.6
C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	4	3,137	26.8	16.8	10.4	4	3,154	26.9	17.3
C15	食道癌	5	1,801	15.4	9.5	6.0	5	1,841	15.7	9.9
C61	前列腺(攝護腺)癌	6	1,730	14.8	7.8	5.7	6	1,538	13.1	7.1
C16	胃癌	7	1,433	12.3	6.9	4.7	7	1,436	12.3	7.2
C25	胰臟癌	8	1,349	11.5	6.8	4.5	8	1,360	11.6	7.0
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	748	6.4	3.8	2.5	9	735	6.3	3.8
C91-C95	白血病	10	717	6.1	3.9	2.4	11	653	5.6	3.7
C67	膀胱癌	11	712	6.1	3.3	2.4	10	711	6.1	3.4
C11	鼻咽癌	12	487	4.2	2.6	1.6	12	536	4.6	3.0
C71	腦癌	13	360	3.1	2.1	1.2	14	363	3.1	2.2
C64	腎臟癌	14	334	2.9	1.7	1.1	13	379	3.2	1.9
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	15	312	2.7	1.6	1.0	15	339	2.9	1.7

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人, 男性 11,689,476, 女性 11,892,703人

2. 108年年中人口數計 23,596,027人, 男性 11,709,050, 女性 11,886,977人

3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

單位：人、每十萬人口、%

死亡人數 結構比 %	死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減 百分比
	增減 百分比	每十萬人口 增減數	增減 百分比	每十萬人口 增減數	
100.0	-0.8	-2.1	-3.9	-6.2	-1.0
20.3	-2.3	-1.2	-5.9	-1.9	-2.5
17.6	-1.1	-0.5	-4.4	-1.2	-1.2
12.0	-0.5	-0.2	-3.8	-0.7	-0.7
10.3	-0.4	-0.1	-2.9	-0.5	-0.5
6.0	-2.0	-0.3	-4.3	-0.4	-2.2
5.0	12.7	1.7	9.9	0.7	12.5
4.7	-0.0	-0.0	-3.3	-0.2	-0.2
4.5	-0.6	-0.1	-3.1	-0.2	-0.8
2.4	1.9	0.1	-0.2	-0.0	1.8
2.1	10.0	0.6	4.8	0.2	9.8
2.3	0.3	0.0	-1.7	-0.1	0.1
1.8	-9.0	-0.4	-12.3	-0.4	-9.1
1.2	-0.7	-0.0	-4.7	-0.1	-0.8
1.2	-11.7	-0.4	-11.8	-0.2	-11.9
1.1	-7.8	-0.2	-9.1	-0.2	-8.0

表9 女性主要癌症死亡原因—與上年比較

ICD-10 國際死因 分類號碼	癌症死亡原因	民國109年					民國108年			
		順 位	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	順 位	死亡 人數	每十萬人口	
				死亡率	標準化 死亡率				死亡率	標準化 死亡率
C00-C97	惡性腫瘤		19,911	167.4	86.7	100.0		19,689	165.6	88.5
C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	1	3,592	30.2	15.1	18.0	1	3,511	29.5	15.3
C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	2	2,853	24.0	11.8	14.3	2	2,775	23.3	11.8
C50	女性乳癌	3	2,655	22.3	12.8	13.3	3	2,633	22.2	13.1
C22	肝和肝內膽管癌	4	2,477	20.8	10.0	12.4	4	2,518	21.2	10.5
C25	胰臟癌	5	1,101	9.3	4.7	5.5	5	1,137	9.6	5.0
C16	胃癌	6	906	7.6	3.8	4.6	6	943	7.9	4.0
C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	7	724	6.1	3.6	3.6	7	683	5.7	3.5
C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	8	668	5.6	3.1	3.4	8	674	5.7	3.2
C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	546	4.6	2.3	2.7	9	540	4.5	2.3
C91-C95	白血病	10	459	3.9	2.2	2.3	10	470	4.0	2.3
C54	子宮體癌	11	444	3.7	2.2	2.2	11	392	3.3	1.9
C67	膀胱癌	12	353	3.0	1.3	1.8	12	375	3.2	1.5
C23-C24	膽囊和其他膽道癌	13	314	2.6	1.3	1.6	13	278	2.3	1.2
C71	腦癌	14	270	2.3	1.4	1.4	14	278	2.3	1.7
C45-C49	間皮和軟組織癌	15	247	2.1	1.2	1.2	16	234	2.0	1.2

附註：1. 109年年中人口數計 23,582,179人，男性 11,689,476，女性 11,892,703人

2. 108年年中人口數計 23,596,027人，男性 11,709,050，女性 11,886,977人

3. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

單位：人、每十萬人口、%

死亡人數 結構比 %	死亡率		標準化死亡率		死亡人數 增減 百分比
	增減 百分比	每十萬人 口增減數	增減 百分比	每十萬人 口增減數	
100.0	1.1	1.8	-2.0	-1.8	1.1
17.8	2.3	0.7	-1.0	-0.1	2.3
14.1	2.8	0.6	0.3	0.0	2.8
13.4	0.8	0.2	-2.4	-0.3	0.8
12.8	-1.7	-0.4	-4.6	-0.5	-1.6
5.8	-3.2	-0.3	-5.7	-0.3	-3.2
4.8	-4.0	-0.3	-5.6	-0.2	-3.9
3.5	6.0	0.3	5.2	0.2	6.0
3.4	-0.9	-0.1	-4.2	-0.1	-0.9
2.7	1.1	0.0	-2.5	-0.1	1.1
2.4	-2.4	-0.1	-5.9	-0.1	-2.3
2.0	13.2	0.4	12.0	0.2	13.3
1.9	-5.9	-0.2	-11.0	-0.2	-5.9
1.4	12.9	0.3	5.1	0.1	12.9
1.4	-2.9	-0.1	-14.1	-0.2	-2.9
1.2	5.5	0.1	4.4	0.1	5.6

表10 歷年新生兒、嬰兒及孕產婦死亡概

年 別	新 生 兒				嬰	
	計 (人)	男 (人)	女 (人)	死亡率 (每千活產)	計 (人)	男 (人)
民國85年	1129	621	508	3.5	2169	1183
民國86年	1064	578	486	3.3	2071	1123
民國87年	918	546	372	3.4	1784	1015
民國88年	980	554	426	3.4	1721	977
民國89年	1038	575	463	3.4	1789	992
民國90年	865	485	380	3.4	1559	863
民國91年	745	415	330	3.0	1325	721
民國92年	624	324	300	2.7	1105	574
民國93年	623	358	265	2.9	1146	645
民國94年	605	343	262	2.9	1026	563
民國95年	554	307	247	2.7	943	524
民國96年	588	342	246	2.9	959	547
民國97年	538	291	247	2.7	897	496
民國98年	452	233	219	2.4	778	417
民國99年	429	246	183	2.6	705	403
民國100年	530	293	237	2.7	832	452
民國101年	538	312	226	2.3	860	485
民國102年	459	252	207	2.4	767	426
民國103年	458	258	200	2.2	761	446
民國104年	539	291	248	2.5	881	490
民國105年	505	289	216	2.4	811	439
民國106年	486	267	219	2.5	772	412
民國107年	474	257	217	2.6	752	416
民國108年	413	237	176	2.4	671	379
民國109年	387	210	177	2.4	586	333

附註：本表資料自民國97年起死因分類為ICD-10。

既況

兒		孕產婦	
女 (人)	死亡率 (每千活產)	死亡數 (人)	死亡率 (每十萬活產)
986	6.7	25	7.7
948	6.4	30	9.2
769	6.6	24	8.9
744	6.1	24	8.4
797	5.8	24	7.8
696	6.0	18	7.0
604	5.4	19	7.7
531	4.9	15	6.6
501	5.3	12	5.5
463	5.0	15	7.3
419	4.6	15	7.3
412	4.7	14	6.9
401	4.6	13	6.6
361	4.0	16	8.3
302	4.2	7	4.2
380	4.2	10	5.0
375	3.7	20	8.5
341	3.9	18	9.2
315	3.6	14	6.6
391	4.1	25	11.7
372	3.9	24	11.6
360	4.0	19	9.8
336	4.2	22	12.2
292	3.8	28	16.0
253	3.6	21	13.0

表11 歷年事故傷害與蓄意自我傷害（自殺）死亡概

年 別	事 故 傷 害											
			運 輸 事 故				意外中毒		意外墜落		火及火燄所致	
	死亡 人數	死亡率	死亡 人數	死亡率	機動車交通事故		死亡 人數	死亡率	死亡 人數	死亡率	死亡 人數	死亡率
民國85年	12,422	57.9	7,160	33.4	7,077	33.0	517	2.4	1,326	6.2	354	1.7
民國86年	11,297	52.2	6,646	30.7	6,516	30.1	480	2.2	1,260	5.8	260	1.2
民國87年	10,973	50.3	6,203	28.4	5,903	27.0	382	1.7	1,276	5.8	289	1.3
民國88年	12,960	58.9	5,648	25.7	5,526	25.1	410	1.9	1,466	6.7	217	1.0
民國89年	10,515	47.4	5,534	24.9	5,420	24.4	448	2.0	1,590	7.2	234	1.1
民國90年	9,513	42.6	4,868	21.8	4,787	21.4	401	1.8	1,336	6.0	188	0.8
民國91年	8,489	37.8	4,627	20.6	4,322	19.2	333	1.5	1,169	5.2	155	0.7
民國92年	8,191	36.3	4,484	19.9	4,389	19.5	349	1.6	1,180	5.2	159	0.7
民國93年	8,453	37.3	4,850	21.4	4,735	20.9	324	1.4	1,187	5.2	137	0.6
民國94年	8,365	36.8	4,846	21.3	4,735	20.8	308	1.4	1,252	5.5	122	0.5
民國95年	8,011	35.1	4,748	20.8	4,637	20.3	301	1.3	1,166	5.1	126	0.6
民國96年	7,130	31.1	4,127	18.0	4,007	17.5	324	1.4	1,137	5.0	95	0.4
	事故傷害		運輸事故		機動車交通事故		與接觸有毒物質所致的意		跌倒(落)		暴露於煙霧、火災與火焰	
民國97年	7,077	30.8	3,871	16.8	3,646	15.9	323	1.4	1,157	5.0	116	0.5
民國98年	7,358	31.9	3,695	16.0	3,464	15.0	344	1.5	1,047	4.5	101	0.4
民國99年	6,669	28.8	3,773	16.3	3,515	15.2	274	1.2	1,178	5.1	74	0.3
民國100年	6,726	29.0	3,704	16.0	3,470	15.0	242	1.0	1,120	4.8	105	0.5
民國101年	6,873	29.5	3,497	15.0	3,291	14.1	325	1.4	1,270	5.5	133	0.6
民國102年	6,619	28.4	3,314	14.2	3,129	13.4	343	1.5	1,318	5.6	88	0.4
民國103年	7,118	30.4	3,428	14.6	3,135	13.4	464	2.0	1,453	6.2	121	0.5
民國104年	7,033	30.0	3,204	13.7	2,922	12.5	570	2.4	1,384	5.9	119	0.5
民國105年	7,206	30.6	3,245	13.8	2,964	12.6	544	2.3	1,541	6.6	128	0.5
民國106年	6,965	29.6	3,242	13.8	3,005	12.8	560	2.4	1,499	6.4	115	0.5
民國107年	6,846	29.0	3,209	13.6	2,911	12.3	519	2.2	1,409	6.0	119	0.5
民國108年	6,640	28.1	3,082	13.1	2,814	11.9	450	1.9	1,487	6.3	92	0.4
民國109年	6,767	28.7	3,117	13.2	2,776	11.8	430	1.8	1,484	6.3	113	0.5

附註：本表資料自民國97年起死因分類為ICD-10。

況

單位：人、每十萬人口

				自殺及自傷	
意外之淹死及溺水		其 他			
死亡 人數	死亡率	死亡 人數	死亡率	死亡 人數	死亡率
1,115	5.2	1,950	9.1	1,847	8.6
917	4.2	1,734	8.0	2,172	10.0
934	4.3	1,889	8.7	2,177	10.0
829	3.8	4,390	19.9	2,281	10.4
836	3.8	1,873	8.4	2,471	11.1
853	3.8	1,867	8.4	2,781	12.4
629	2.8	1,576	7.0	3,053	13.6
616	2.7	1,403	6.2	3,195	14.2
570	2.5	1,385	6.1	3,468	15.3
626	2.8	1,211	5.3	4,282	18.8
550	2.4	1,120	4.9	4,406	19.3
507	2.2	940	4.1	3,933	17.2
意外溺死或淹沒		其 他		蓄意自我傷害 (自殺)	
492	2.1	1,118	4.9	4,128	17.9
465	2.0	1,706	7.4	4,063	17.6
381	1.6	989	4.3	3,889	16.8
344	1.5	1,211	5.2	3,507	15.1
413	1.8	1,235	5.3	3,766	16.2
359	1.5	1,197	5.1	3,565	15.3
327	1.4	1,325	5.7	3,542	15.1
370	1.6	1,386	5.9	3,675	15.7
368	1.6	1,380	5.9	3,765	16.0
342	1.5	1,207	5.1	3,871	16.4
326	1.4	1,264	5.4	3,865	16.4
302	1.3	1,227	5.2	3,864	16.4
329	1.4	1,294	5.5	3,656	15.5

表12 歷年蓄意自我傷害（自殺）年齡別死亡率^註

年別	標準化 死亡率	死亡率	5-9 歲	10-14 歲	15-19 歲	20-24 歲	25-29 歲	30-34 歲	35-39 歲	40-44 歲	45-49 歲	50-54 歲	55-59 歲
民國85年	8.7	8.6	0.1	0.3	2.5	6.0	9.2	10.5	8.9	10.5	10.2	10.5	16.8
民國86年	10.0	10.0	0.1	0.6	2.8	5.9	9.4	11.9	12.4	12.1	12.0	13.5	18.7
民國87年	9.8	10.0		0.2	2.7	5.8	9.5	12.8	11.2	12.0	13.0	13.0	16.2
民國88年	10.0	10.4		0.3	2.0	6.7	9.3	12.1	11.7	13.1	13.3	15.3	18.1
民國89年	10.6	11.1		0.5	2.0	6.0	10.5	11.9	12.5	13.7	13.8	15.2	18.6
民國90年	11.7	12.4		0.5	2.9	6.4	11.1	12.7	14.8	14.9	15.3	17.8	22.2
民國91年	12.5	13.6		0.2	3.2	8.2	12.6	16.3	15.6	18.1	19.0	19.3	24.4
民國92年	12.8	14.2	0.1	0.4	3.2	8.5	12.0	16.9	18.1	17.7	19.1	19.9	20.4
民國93年	13.6	15.3		0.2	3.5	8.5	15.1	17.0	22.0	19.1	21.4	21.9	20.2
民國94年	16.6	18.8		0.5	3.8	10.8	21.8	22.9	23.1	26.0	24.2	27.8	29.4
民國95年	16.8	19.3	0.1	0.5	2.9	10.5	19.3	25.7	26.1	27.5	23.6	26.1	27.7
民國96年	14.7	17.2		0.3	3.3	10.8	16.8	19.5	20.6	23.1	21.9	22.0	25.1
民國97年	15.2	17.9	0.1	0.5	2.8	9.4	17.6	20.7	22.5	25.7	23.4	22.1	24.1
民國98年	14.7	17.6		0.4	3.7	8.9	15.8	19.9	22.7	23.0	23.1	23.7	26.6
民國99年	13.8	16.8		0.4	3.0	8.1	14.3	19.1	18.4	22.8	21.9	22.7	22.5
民國100年	12.3	15.1		0.3	2.6	8.3	13.0	16.5	18.5	19.5	19.7	17.9	18.8
民國101年	13.1	16.2		0.6	3.1	9.0	16.0	17.6	20.1	19.8	22.1	17.8	19.7
民國102年	12.0	15.3		0.3	2.6	7.7	11.7	15.5	17.4	19.2	19.6	18.3	20.0
民國103年	11.8	15.1		0.2	2.3	7.8	10.3	14.9	19.3	17.7	19.7	18.9	19.6
民國104年	12.1	15.7		0.5	2.8	8.8	12.3	15.2	17.3	18.5	21.6	18.2	20.3
民國105年	12.3	16.0		0.5	3.8	9.5	11.7	15.6	17.9	18.6	18.0	20.9	21.0
民國106年	12.5	16.4		0.4	4.1	8.4	13.3	16.4	17.9	18.3	20.1	20.8	21.1
民國107年	12.5	16.4		0.9	4.4	9.5	12.6	16.2	16.8	19.6	20.3	21.0	22.3
民國108年	12.6	16.4		1.0	6.2	11.5	12.4	16.2	16.9	18.5	21.1	21.9	21.3
民國109年	11.8	15.5		2.1	5.8	11.2	14.0	14.5	15.8	15.5	16.7	20.5	19.8

附註：本表資料自民國97年起死因分類為ICD-10。

率

單位：每十萬人口

60-64 歲	65歲以 上小計	65-69 歲	70-74 歲	75-79 歲	80-84 歲	85+ 歲
15.3	30.3	20.4	33.1	34.7	47.3	49.4
18.8	34.0	26.3	31.1	47.4	48.6	37.6
19.5	32.8	26.7	28.6	36.7	48.2	59.3
21.2	32.0	24.2	34.3	36.6	38.5	45.0
25.7	35.5	24.0	34.3	44.0	51.6	55.7
27.4	37.6	27.4	36.8	45.3	50.4	52.5
26.2	33.9	27.1	31.6	38.6	47.7	41.1
29.8	35.2	27.1	31.8	41.3	46.6	51.9
25.5	36.2	26.0	34.8	39.6	54.5	49.2
32.2	37.3	29.2	35.6	42.9	47.4	45.7
31.0	39.3	33.5	39.2	39.1	48.4	49.3
30.7	36.3	29.5	34.1	40.3	47.6	41.8
31.9	36.6	32.3	35.5	39.0	43.9	38.5
28.7	33.9	31.0	32.2	31.9	40.9	42.4
25.2	35.8	31.8	35.6	35.8	41.2	41.2
23.3	32.2	26.4	29.4	31.9	39.3	46.2
24.1	32.6	27.7	31.0	32.5	37.2	43.1
23.9	32.1	22.5	28.6	38.3	38.5	46.6
21.8	31.3	23.9	31.3	35.7	37.5	36.2
22.6	31.2	23.5	27.4	36.3	42.2	39.2
20.4	32.3	23.6	32.0	36.5	41.4	42.1
22.7	31.1	23.2	30.1	36.0	40.7	40.3
22.2	28.4	22.0	23.7	36.4	37.4	36.6
19.5	27.2	21.1	26.4	32.9	34.7	32.4
18.8	26.6	19.2	25.3	31.2	32.6	42.7