

111 年死因統計結果分析

依世界衛生組織（WHO）疾病分類（ICD-10）及死因選取準則，採導致死亡的起始病因為分類基準，完成我國死因統計。

2016 年版 ICD-10 大幅修訂死因選取準則，主要修訂方向有下列 3 項：一為不選症狀徵候及不明確編碼（俗稱垃圾碼），二隨公衛醫學進步及疾病型態多元，疾病間因果關係或有更迭，依最新實證醫學修訂疾病間因果關係，三隨人類壽命愈趨高齡，年長者呼吸衰竭、心臟停止等死因允許選取衰老或老邁作為死因。

108 年起我國死因統計改依 WHO「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」，在選取準則不同基礎下，為剔除不同準則版本因素，以利純疾病因素前後時間資料比較，故將 107 年死亡資料重新依「2016 年版 ICD-10 死因選取準則」計算，兩者（新舊）比值稱「轉換比值」。並依「轉換比值」回推 97-106 年死因資料，稱「經轉換比值調整後值」，與原發布數做一區隔，本文分析中，107 年以前之各年比較資料均為「經轉換比值調整後值」。以下分別就死亡人數變化概況、主要死因分析加以說明。


壹、死亡人數變化概況

一、111 年標準化死亡率較 110 年上升 9.5%

111 年國人死亡人數計 20 萬 8,438 人，較上(110)年上升 13.2%(或增 2 萬 4,266 人)，死亡率（死亡人數除以年中人口數）為每十萬人口 893.8 人，上升 13.9%，受 COVID-19 疫情及人口老化影響，致 111 年死亡人數較上年增加 2 萬餘人。若以 WHO 西元 2000 年世界標準人口年齡結構計算之標準化死亡率為每十萬人口 443.9 人，上升 9.5%。

就長期變化趨勢觀察，隨人口成長及高齡人口比重增加，死亡人數呈上升趨勢，近 10 年死亡人數平均年增 3.1%，死亡率平均年升 3.1%，標準化死亡率則平均年降 0.1%。

圖 1 歷年死亡人數及死亡率



二、男、女性死亡人數分別升 12.5%、14.2%

111 年男性死亡人數 12 萬 405 人，較上年上升 12.5%，女性 8 萬 8,033 人，升 14.2%，男性死亡人數約為女性之 1.4 倍，與上年差距相同。


男性標準化死亡率為每十萬人口 583.5 人，較上年上升 10.1%，較 101 年上升 1.8%；女性標準化死亡率為每十萬人口 322.1 人，較上年上升 9.0%，較 101 年下降 4.0%，男性為女性的 1.8 倍。

三、65 歲以上死亡數占 76.3%

受人口結構快速高齡化影響，65 歲以上死亡者占總死亡人數比率呈現逐年遞增趨勢，111 年 65 歲以上死亡人數 15 萬 9,059 人，較上年升 16.0%（或增 2 萬 1,898 人）；占總死亡人數比重達 76.3%，較上年增 1.8 個百分點，較 101 年增 7.5 個百分點。

111 年 65 歲以上死亡人口中，65-74 歲者占全部死亡人數 19.6%，較 101 年增 2.9 個百分點，75-84 歲者占 24.5%，較 101 年減 4.5 個百分點，85 歲以上者占 32.2%，則較 101 年上升 9.1 個百分點，顯示 65 歲以上死亡人數占比提高，主要係因 85 歲以上死亡人數快速增加所致。

圖 2 歷年死亡人數年齡結構



貳、主要死因分析

死因統計與分析有助於公共衛生政策之規劃與全民健康之提升，以下先概述 111 年國內十大死因，次就居十大死因首位之癌症，以及事故傷害與自殺死亡等各界較關注之死因進一步說明，最後分析年齡別主要死因差異。

一、十大死因

(一) 惡性腫瘤（癌症）續居十大死因首位

111 年十大死因，依序為每十萬人口中(1)癌症死亡 222.7 人(2)心臟疾病 101.5 人(3)嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）62.9 人(4)肺炎 61.4 人(5)腦血管疾病 53.2 人(6)糖尿病 52.7 人(7)高血壓性疾病 37.4 人(8)事故傷害 29.8 人(9)慢性下呼吸道疾病 27.8 人(10)腎炎、腎病症候群及腎病變 24.9 人；十大死因合計

死亡人數 15 萬 7,267 人，占總死亡人數之 75.5%，以慢性疾病為主。癌症自 71 年起已連續 41 年居國人死因首位。


表 1 十大死因死亡人數及死亡率

順位	所有死亡原因	死亡人數(人)		死亡率(每十萬人口)			標準化死亡率(每十萬人口)		
		111年	較上年增減%	110年順位	111年	較上年增減%	順位	111年	較上年增減%
		208,438	13.2		893.8	13.9		443.9	9.5
1	癌症	51,927	0.5	1	222.7	1.2	1	116.0	-1.8
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	23,668	8.3	2	101.5	9.0	2	47.8	4.8
3	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	14,667	1,536.9	19	62.9	1,547.4	3	28.6	1,365.5
4	肺炎	14,320	5.7	3	61.4	6.4	4	26.3	3.8
5	腦血管疾病	12,416	1.9	4	53.2	2.6	5	25.1	-0.3
6	糖尿病	12,289	7.3	5	52.7	8.0	6	24.7	3.7
7	高血壓性疾病	8,720	10.6	6	37.4	11.3	8	16.3	7.2
8	事故傷害	6,953	2.6	7	29.8	3.3	7	20.0	0.2
9	慢性下呼吸道疾病	6,494	4.1	8	27.8	4.8	10	11.8	1.6
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	5,813	6.3	9	24.9	6.9	11	11.3	3.5

(二) 111 年十大死因新增嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)

111 年十大死因與上年相較，癌症及心臟疾病排名不變，均居前 2 位，嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 上升至第 3 位，其餘均下降 1 位。若與 101 年相較，癌症及心臟疾病均居前 2 位；新增之嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 居第 3 位；另順位上升者有高血壓性疾病，順位下降者有腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病。

圖 3 十大死因死亡率-111 年 vs. 101 年



說明：101 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。


(三) 十大死因按性別排序

觀察男女性十大死因，111 年男性死亡率多高於女性，其中又以慢性肝病及肝硬化男性死亡率為女性 2.6 倍（每十萬人口 25.6 人／9.8 人），慢性下呼吸道疾病為 2.5 倍（39.7 人／16.2 人），事故傷害為 2.3 倍（41.8 人／18.1 人），差異較明顯。

就性別主要死因觀察，男性 111 年十大死因依序為每十萬人口中（1）癌症死亡 270.0 人（2）心臟疾病 117.3 人（3）肺炎 74.2 人（4）嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）72.6 人（5）腦血管疾病 61.9 人（6）糖尿病 54.6 人（7）事故傷害 41.8 人（8）慢性下呼吸道疾病 39.7 人（9）高血壓性疾病 37.5 人（10）慢性肝病及肝硬化 25.6 人，與上年相較，癌症、心臟疾病、肺炎排名不變，均居前 3 位，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）上升至第 4 位，其餘均下降 1 位。

女性 111 年十大死因依序為每十萬人口中（1）癌症死亡 176.3 人（2）心臟疾病 86.1 人（3）嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）53.4 人（4）糖尿病 50.8 人（5）肺炎 48.8 人（6）腦血管疾病 44.8 人（7）高血壓性疾病 37.3 人（8）腎炎、腎病症候群及腎病變 24.5 人（9）事故傷害 18.1 人（10）血管性及未明示之失智症 16.4 人，與上年相較，癌症、心臟疾病、血管性及未明示之失智症排名不變，嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）上升至第 3 位，其餘均下降 1 位。

圖 4 111 年十大死因死亡率



(四) 死亡年齡中位數 78 歲

111 年死亡者之年齡中位數為 78 歲，男性 74 歲，女性 82 歲，均較 110 年增加 1 歲。十大死因中，心臟疾病、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變等 8 類死因死亡年齡中位數均高於所有死因之 78 歲。事故傷害死亡年齡中位數僅 65 歲，且男性低於女性之歲數為 10 歲。

表 2 十大死因死亡年齡中位數

單位：歲

順位	死亡原因	111年			較110年增減歲數		
		合計	男	女	合計	男	女
	所有死因	78	74	82	1	1	1
1	癌症	70	69	72	-	-	-
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	80	75	85	-	1	1
3	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	82	80	84	10	8	10
4	肺炎	85	83	86	-	-	-
5	腦血管疾病	80	75	83	-	-1	-
6	糖尿病	79	75	82	-	1	-
7	高血壓性疾病	84	80	87	-	1	-
8	事故傷害	65	62	72	1	1	2
9	慢性下呼吸道疾病	84	83	87	-	-1	1
10	腎炎、腎病症候群及腎病變	81	79	83	-	-	-


二、癌症

（一）長期觀察，癌症標準化死亡率呈下降趨勢

111年國人癌症死亡人數為5萬1,927人(男性3萬1,158人,女性2萬769人),占總死亡人數之24.9%,較上年上升0.5%(或增271人),近10年平均年增率為1.6%。

111年癌症死亡率為每十萬人口222.7人,較上年上升1.2%,近10年平均年增率為1.6%;標準化死亡率為每十萬人口116.0人,較上年下降1.8%,近10年標準化死亡率平均年降1.3%。


圖 5 歷年癌症死亡人數及死亡率



說明：101-107年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

65歲以上癌症死亡人數為3萬4,407人,較上年上升1.4%,較101年上升30.7%;0-64歲癌症死亡1萬7,520人,較上年下降1.2%,較101年減1.7%,65歲以上癌症死亡數占比呈上升趨勢。

圖 6 歷年癌症死亡人數




說明：101-107 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

(二) 十大癌症順位

依死亡率排序，111 年十大癌症死因依序為每十萬人口中 (1) 氣管、支氣管和肺癌死亡 43.1 人 (2) 肝和肝內膽管癌 33.4 人 (3) 結腸、直腸和肛門癌 29.4 人 (4) 女性乳癌 24.1 人 (5) 前列腺 (攝護腺) 癌 15.9 人 (6) 口腔癌 14.9 人 (7) 胰臟癌 11.9 人 (8) 胃癌 9.8 人 (9) 食道癌 8.5 人 (10) 卵巢癌 6.5 人。與 101 年比較，順位上升者有前列腺癌、胰臟癌與卵巢癌，順位下降者有口腔癌、胃癌、食道癌。


圖 7 十大癌症死因死亡率-111 年 vs. 101 年



說明：101 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

就近 10 年順位上升之癌症死因觀察，111 年前列腺癌死亡人數 1,830 人，較上年上升 8.3%，死亡率每十萬人口 15.9 人，亦較上年上升 9.2%；若與 101 年比較，前列腺癌死亡人數及死亡率分別上升 46.0%及 47.5%，順位由第 6 位上升至第 5 位。


圖 7-1 近年前列腺（攝護腺）癌死亡概況



說明：101-107 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

111 年胰臟癌死亡人數 2,769 人，較上年上升 4.1%，死亡率為每十萬人口 11.9 人，亦較上年上升 4.8%；若與 101 年比較，胰臟癌死亡人數及死亡率分別上升 67.1%及 66.8%，順位由第 9 位上升至第 7 位。


圖 7-2 近年胰臟癌死亡概況



說明：101-107 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

111 年卵巢癌死亡人數 765 人，較上年上升 9.9%，死亡率每十萬人口 6.5 人，亦較上年上升 10.5%；若與 101 年比較，卵巢癌死亡人數及死亡率分別上升 40.4% 及 38.4%，順位由第 11 位上升至第 10 位。

圖 7-3 近年卵巢癌死亡概況




說明：101-107 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

(三) 十大癌症按性別分

十大癌症死因以性別觀察，男、女性之第一大癌症死因均為肺癌，男性第 2 與第 3 順位癌症死因為肝癌與結腸直腸癌，女性則為結腸直腸癌與乳癌，十大癌症死因中男、女性死亡率差距較大者為口腔癌。

圖 8 111 年十大癌症死因死亡率



(四) 癌症死亡年齡中位數 70 歲

111 年癌症死亡者之年齡中位數為 70 歲，男性 69 歲，女性 72 歲，男女性皆與上年相同。十大癌症死因中，女性乳癌、口腔癌、食道癌與卵巢癌之死亡年齡中位數低於所有癌症死亡年齡中位數，其中口腔癌、食道癌、卵巢癌皆僅 62 歲。

表 3 十大癌症死亡年齡中位數

單位：歲

順位	死亡原因	111年			較110年增減歲數		
		合計	男	女	合計	男	女
	癌症	70	69	72	-	-	-
1	氣管、支氣管和肺癌	71	71	72	-1	-	-1
2	肝和肝內膽管癌	71	69	77	-	-	-
3	結腸、直腸和肛門癌	73	71	76	-	-	-
4	女性乳癌	64	...	64	1	...	1
5	前列腺(攝護腺)癌	82	82	...	-	-	...
6	口腔癌	62	62	71	1	1	-
7	胰臟癌	71	69	73	1	1	-
8	胃癌	73	73	74	-	-	-
9	食道癌	62	62	68	1	1	-
10	卵巢癌	62	...	62	-1	...	-1

三、事故傷害

(一) 111 年事故傷害死亡人數較 10 年前增 80 人 (或 1.2%)

事故傷害係指非蓄意性傷害事件，如「運輸事故」、「因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒」、「跌倒(落)」、「暴露於煙霧、火災與火焰」、「意外溺死或淹沒」等。111 年事故傷害死亡人數為 6,953 人，居國人死因第 8 位。就事故傷害各死因死亡人數觀察，111 年運輸事故死亡 3,143 人，占 45.2%；跌倒(落)致死 1,667 人，占 24.0%；因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒者 386 人，占 5.6%；意外溺死或淹沒者 321 人，占 4.6%；暴露於煙霧、火災與火焰者 113 人，占 1.6%。

111 年事故傷害死亡數較上年增加 178 人，其中「跌倒(落)」、「運輸事故」、「意外溺死或淹沒」分別增加 185 人、111 人、30 人；「因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒」、「暴露於煙霧、火災與火焰」則分別減少 96 人、52 人。

與 101 年比較，運輸事故死亡者減少 354 人，主要係機動車交通事故死亡人數大幅減少 524 人所致；「意外溺死或淹沒」、「暴露於煙霧、火災與火焰」分別減少 92 人、20 人；「跌倒(落)」、「因暴露與接觸有毒物質所致的意外中毒」分別增加 397 人、61 人。

表 4 歷年事故傷害死亡原因


單位：人

	事故傷害	運輸事故		因暴露與接觸 有毒物質所致 的意外中毒	跌倒(落)	暴露於煙 霧、火災 與火焰	意外溺死或 淹沒	其他
			機動車事故					
101年	6,873	3,497	3,291	325	1,270	133	413	1,235
102年	6,619	3,314	3,129	343	1,318	88	359	1,197
103年	7,118	3,428	3,135	464	1,453	121	327	1,325
104年	7,033	3,204	2,922	570	1,384	119	370	1,386
105年	7,206	3,245	2,964	544	1,541	128	368	1,380
106年	6,965	3,242	3,005	560	1,499	115	342	1,207
107年	6,846	3,209	2,911	519	1,409	119	326	1,264
108年	6,640	3,082	2,814	450	1,487	92	302	1,227
109年	6,767	3,117	2,776	430	1,484	113	329	1,294
110年	6,775	3,032	2,623	482	1,482	165	291	1,323
111年	6,953	3,143	2,767	386	1,667	113	321	1,323
111年死亡 人數結構比	100.0%	45.2%	39.8%	5.6%	24.0%	1.6%	4.6%	19.0%

(二) 男性事故傷害死亡人數較上年增 106 人，女性增 72 人

111 年國人事故傷害死亡男性 4,823 人 (占 69.4%)，較 110 年增 106 人；女性 2,130 人 (占 30.6%)，增 72 人。


圖 9 歷年事故傷害死亡人數及死亡率



(三) 事故傷害各年齡層死亡率均較 10 年前下降至少 12%

若就 0-24 歲、25-44 歲、45-64 歲及 65 歲以上等年齡層觀察事故傷害死亡概況，111 年除 65 歲以上死亡人數較上年增加 312 人（或 9.5%）外，其餘年齡組均減少，其中以 0-24 歲減少 51 人（或 8.7%）最為明顯。111 年各年齡層事故傷害死亡率，以 65 歲以上者之每十萬人口 89.3 人最高，最低為 0-24 歲者之每十萬人口 10.1 人；若與 101 年相較，各年齡層死亡率均呈下降。

圖 10 歷年事故傷害年齡別死亡人數及死亡率



四、蓄意自我傷害（自殺）


（一）111 年自殺死亡人數 3,787 人

111 年自殺死亡人數為 3,787 人，較上年增加 202 人（或 5.6%），居國人主要死因之第 12 位，較上年下降 1 位；死亡率為每十萬人口 16.2 人，與上年相較上升 6.3%，若與 101 年相較，死亡率則相當。

（二）男性自殺死亡人數高於女性

111 年自殺死亡人數中男性 2,419 人（占 63.9%），較上年增 89 人（或 3.8%），居男性死因第 12 位；女性 1,368 人（占 36.1%），較上年增 113 人（或 9.0%），為女性死因之第 13 位；男性自殺死亡率為每十萬人口 21.0 人，約為女性 11.6 人的 1.8 倍。

圖 11 歷年蓄意自我傷害（自殺）死亡人數及死亡率




（三）111 年各年齡層自殺死亡人數及死亡率均較上年增加

111 年 65 歲以上自殺死亡人數 1,138 人（占 30.1%），45-64 歲 1,270 人（占 33.5%），25-44 歲 1,096 人（占 28.9%），0-24 歲 283 人（占 7.5%），與上年相較，分別增加 73 人、30 人、77 人、22 人。

111 年各年齡層自殺死亡率，65 歲以上自殺死亡率為每十萬人口 28.4 人，45-64 歲為每十萬人口 17.9 人，25-44 歲為每十萬人口 15.9 人，0-24 歲為每十萬人口 5.3 人。與上年比較，65 歲以上上升 2.9%，45-64 歲上升 2.2%，25-44 歲上升 9.3%，0-24 歲上升 12.4%。

圖 12 歷年蓄意自我傷害（自殺）年齡別死亡人數及死亡率



五、年齡別主要死因

就 111 年不同年齡層觀察事故傷害死因排名，1-14 歲及 15-24 歲居首位，25-44 歲居第 3 位，0 歲居第 4 位；另 15-24 歲及 25-44 歲死亡人口中，自殺均居死因第 2 位。

25-44 歲、45-64 歲及 65 歲以上死亡人口均以癌症為死因首位；25-44 歲及 45-64 歲中，慢性肝病及肝硬化均居第 5 位死因；65 歲以上死亡人口之四大死因與全國之死因相同，惟肺炎、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）相較全國排序對調。

表 5 111 年年齡別五大死因

年齡總計		0歲		1-14歲		15-24歲		25-44歲		45-64歲		65歲以上		
順位	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率 (每十萬活產)	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率	死亡原因	死亡率
	所有死亡原因	893.8	所有死亡原因	438.9	所有死亡原因	12.2	所有死亡原因	44.2	所有死亡原因	108.0	所有死亡原因	563.0	所有死亡原因	3,964.2
1	癌症	222.7	先天性畸形、變形及染色體異常	79.1	事故傷害	2.5	事故傷害	17.7	癌症	24.7	癌症	221.1	癌症	857.5
2	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	101.5	源於周產期的呼吸性疾患	70.5	癌症	2.0	蓄意自我傷害（自殺）	10.7	蓄意自我傷害（自殺）	15.9	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	58.3	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	467.1
3	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	62.9	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	47.5	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	1.2	癌症	3.5	事故傷害	14.1	腦血管疾病	28.5	肺炎	326.2
4	肺炎	61.4	事故傷害	23.0	先天性畸形、變形及染色體異常	0.9	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	1.8	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	10.5	糖尿病	26.7	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	315.5
5	腦血管疾病	53.2	特發於周產期的感染	15.8	心臟疾病（高血壓性疾病除外）	0.7	嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）	1.0	慢性肝病及肝硬化	6.8	慢性肝病及肝硬化	26.6	糖尿病	253.9


以下將進一步就兒少（0-17 歲）及高齡（65 歲以上）人口死亡率之變化趨勢加以說明。

(一)就長期趨勢觀察，兒少死亡人數及死亡率呈下降趨勢

111 年 0-17 歲之兒少死亡人數 1,108 人，較上年減少 53 人（或 4.6%），較 101 年 1,693 人減少 585 人（或 34.6%），以死亡人數除以該年齡層人口數計算，兒少死亡率為每十萬人口 31.9 人，較上年減少 0.7 人，較 10 年前減少 6.4 人。

就男女性兒少死亡人數及死亡率觀察，男性均高於女性，111 年男性死亡人數 641 人（較 101 年減 342 人或降 34.8%），死亡率為每十萬人口 35.5 人（每十萬人口減 7.1 人），女性死亡人數 467 人（減 243 人或降 34.2%），死亡率 28.0 人（每十萬人口減 5.5 人）。


圖 13 歷年兒少死亡人數及死亡率



若分別就兒童（0-11 歲）與少年（12-17 歲）來看，111 年兒童死亡人數 867 人，占兒少死亡人數之 78.2%，少年 241 人，占 21.8%。與 101 年比較，少年死亡人數降 41.5%（或減 171 人），兒童降 32.3%（減 414 人）。

111 年兒童死亡人數中有 610 人為嬰兒（未滿 1 歲，其中未滿 4 週之新生兒 383 人），較上年減 37 人，占兒童死亡之 70.4%。111 年兒童死亡率為每十萬人口 38.0 人，少年為 20.2 人，每十萬人口分別較 101 年減 11.4 人及 2.3 人。

圖14 歷年兒童及少年死亡人數及死亡率



111年兒少五大死因依序為(1)源於周產期的特定病況(2)事故傷害(3)先天性畸形、變形及染色體異常(4)癌症(5)蓄意自我傷害(自殺)，合占兒少死亡人數之69.0%。

111年兒童五大死因合占死亡人數之72.3%，依序為(1)源於周產期的特定病況(2)先天性畸形、變形及染色體異常(3)事故傷害(4)癌症(5)嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)。

111年少年死因事故傷害占36.5%、自殺占18.3%、癌症占13.7%，三者合占少年死亡人數之68.5%。五大死因依序為(1)事故傷害(2)蓄意自我傷害(自殺)(3)癌症(4)心臟疾病(高血壓性疾病除外)及嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)並列第4位。

111年五大死因排名與上年比較，兒少之蓄意自我傷害(自殺)由第6位升至第5位，少年之蓄意自我傷害(自殺)與癌症排序對調，分別為第2位及第3位。

表6 111年兒少主要死亡原因

單位：人

順位	0-17歲兒少			0-11歲兒童			12-17歲少年		
	死亡原因	死亡人數	110順位	死亡原因	死亡人數	110順位	死亡原因	死亡人數	110順位
	所有死亡原因	1,108		所有死亡原因	867		所有死亡原因	241	
1	源於周產期的特定病況	328	1	源於周產期的特定病況	327	1	事故傷害	88	1
2	事故傷害	169	2	先天性畸形、變形及染色體異常	133	2	蓄意自我傷害(自殺)	44	3
3	先天性畸形、變形及染色體異常	139	3	事故傷害	81	3	癌症	33	2
4	癌症	79	4	癌症	46	4	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8	4
5	蓄意自我傷害(自殺)	49	6	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	40	-	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	8	-

(二)65 歲以上死因以癌症居首，心臟疾病居次

111 年 65 歲以上死亡數為 15 萬 9,059 人，占總死亡數之 76.3%，較上年增加 1.8 個百分點，死亡率為每十萬人口 3,964.2 人，較上年增加 11.7%；與 101 年比較，死亡率則下降 4.0%。

以死因觀察，越高齡者糖尿病、事故傷害排序有下降趨勢，肺炎、高血壓性疾病排序則趨上升。

表 7 111 年 65 歲以上人口主要死亡原因


單位：人、每十萬人口

順位	65-74歲			75-84歲			85歲以上		
	死亡原因	死亡人數	死亡率	死亡原因	死亡人數	死亡率	死亡原因	死亡人數	死亡率
	所有死亡原因	40,951	1,607.9	所有死亡原因	50,968	4,858.8	所有死亡原因	67,140	16,119.7
1	癌症	14,554	571.4	癌症	11,898	1,134.3	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	8,931	2,144.3
2	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	4,127	162.0	心臟疾病(高血壓性疾病除外)	5,683	541.8	癌症	7,955	1,909.9
3	糖尿病	2,653	104.2	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	4,077	388.7	肺炎	7,237	1,737.5
4	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	2,520	98.9	肺炎	3,918	373.5	嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)	6,064	1,455.9
5	腦血管疾病	2,442	95.9	糖尿病	3,613	344.4	高血壓性疾病	4,218	1,012.7
6	肺炎	1,935	76.0	腦血管疾病	3,468	330.6	腦血管疾病	4,169	1,000.9
7	事故傷害	1,349	53.0	高血壓性疾病	2,104	200.6	糖尿病	3,921	941.4
8	高血壓性疾病	1,243	48.8	慢性下呼吸道疾病	1,839	175.3	慢性下呼吸道疾病	3,226	774.5
9	腎炎、腎病症候群及腎病變	1,175	46.1	腎炎、腎病症候群及腎病變	1,693	161.4	衰老/老邁	2,363	567.3
10	慢性下呼吸道疾病	947	37.2	事故傷害	1,275	121.5	血管性及未明示之失智症	2,349	564.0

若以 65 歲以上人口之三大主要死因死亡率 10 年變動觀之，癌症及肺炎每十萬人口死亡率分別較 101 年減 16.5%、6.3%，心臟疾病則增 1.1%。


再就 65 歲以上人口之年齡別死亡率 10 年變動觀察，65-74 歲及 75-84 歲每十萬人口死亡率分別較 101 年下降 11.5%、4.0%，85 歲以上則上升 22.6%。

圖 15 歷年 65 歲以上三大主要死因死亡率



說明：101-107 年係指「經轉換比值調整後值」，非原發布數。

圖 16 歷年 65 歲以上死亡率-按年齡別



參、轉換比值

108年起我國死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者（新舊）比值稱「轉換比值」。因選取準則不同，為剔除不同準則版本因素，以利純疾病因素前後時間資料比較，歷年資料需經轉換後始得與108-111年比較，附表陳示常用死因之近10年資料，並將「原發布數」乘上「轉換比值」回推歷年資料，呈現相同基礎下之變動情形，回推資料稱之為「經轉換比值調整後值」。

另，死因統計分類繁複，如性別、年齡別、月份別、縣市別、以及兩兩交叉分類等，若就每個複分類均做轉換比值，除過程繁複不利使用者運用，且部分類別數值過小，易因數字微幅變動致轉換比值倍增或減半等，故僅陳示「全國」主要死因及主要癌症之「性別」轉換比值，若使用者有年齡別、縣市別等歷史資料比較需求，可逕使用「全國」轉換比值回推資料，惟選取標準隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

參考附表

附表 1 歷年主要死亡原因

附表 2 歷年男性主要死亡原因

附表 3 歷年女性主要死亡原因

附表 4 歷年主要癌症死亡原因

附表 5 歷年男性主要癌症死亡原因

附表 6 歷年女性主要癌症死亡原因

附表1 歷年主要死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	所有死亡原因			惡性腫瘤			心臟疾病 (高血壓性疾病除外)			嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)			肺炎			腦血管疾病			糖尿病		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	142,283	618.7	484.3	39,345	171.1	135.1	14,317	62.3	47.4	-	-	-	9,165	39.9	29.1	11,540	50.2	37.8	8,412	36.6	28.2
民國98年	142,240	616.3	466.7	40,361	174.9	133.9	13,742	59.5	43.7	-	-	-	8,844	38.3	26.7	11,237	48.7	35.5	8,615	37.3	27.9
民國99年	144,709	625.3	455.6	41,502	179.3	132.9	14,271	61.7	43.4	-	-	-	9,427	40.7	27.1	10,967	47.4	33.1	8,596	37.1	26.5
民國100年	152,030	655.5	462.4	43,032	185.5	133.6	15,034	64.8	43.9	-	-	-	9,573	41.3	26.2	11,713	50.5	33.9	9,506	41.0	28.2
民國101年	153,823	661.0	450.6	44,150	189.7	132.7	15,587	67.0	43.9	-	-	-	9,856	42.4	25.7	11,970	51.4	33.3	9,716	41.8	27.8
民國102年	154,374	661.3	435.3	45,289	194.0	131.8	16,109	69.0	43.7	-	-	-	9,568	41.0	23.7	12,243	52.4	32.7	9,880	42.3	27.1
民國103年	162,886	696.0	443.5	46,605	199.1	131.5	17,661	75.5	46.0	-	-	-	10,955	46.8	26.1	12,698	54.3	32.8	10,307	44.0	27.3
民國104年	163,574	697.2	431.5	47,349	201.8	129.3	17,482	74.5	44.0	-	-	-	11,387	48.5	26.0	12,087	51.5	30.2	9,976	42.5	25.5
民國105年	172,418	733.2	439.4	48,291	205.4	128.1	18,948	80.6	46.1	-	-	-	12,923	55.0	28.4	12,820	54.5	30.9	10,426	44.3	25.7
民國106年	171,857	729.6	424.3	48,571	206.2	124.7	18,795	79.8	44.4	-	-	-	13,206	56.1	28.0	12,721	54.0	29.7	10,306	43.8	24.6
民國107年	172,859	733.1	415.0	49,326	209.2	123.0	19,637	83.3	44.7	-	-	-	14,202	60.2	29.0	12,467	52.9	28.2	9,813	41.6	22.6
民國108年	175,424	743.4	408.2	50,232	212.9	121.3	19,859	84.2	43.6	-	-	-	15,185	64.4	30.0	12,176	51.6	26.7	9,996	42.4	22.3
民國109年	173,067	733.9	390.8	50,161	212.7	117.3	20,457	86.7	43.8	28 ^{註4}	0.1	0.1	13,736	58.2	26.4	11,821	50.1	25.2	10,311	43.7	22.0
民國110年	184,172	784.8	405.5	51,656	220.1	118.2	21,852	93.1	45.6	896 ^{註4}	3.8	2.0	13,549	57.7	25.3	12,182	51.9	25.2	11,450	48.8	23.8
民國111年	208,438	893.8	443.9	51,927	222.7	116.0	23,668	101.5	47.8	14,667 ^{註4}	62.9	28.6	14,320	61.4	26.3	12,416	53.2	25.1	12,289	52.7	24.7
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0111	1.0111	1.0103	0.9104	0.9104	0.9162	-	-	-	1.0582	1.0582	1.0561	1.0822	1.0822	1.0805	1.0468	1.0468	1.0485
原發布數																					
民國97年	142,283	618.7	484.3	38,913	169.2	133.7	15,726	68.4	51.7	-	-	-	8,661	37.7	27.5	10,663	46.4	35.0	8,036	34.9	26.9
民國98年	142,240	616.3	466.7	39,918	173.0	132.5	15,094	65.4	47.7	-	-	-	8,358	36.2	25.3	10,383	45.0	32.8	8,230	35.7	26.6
民國99年	144,709	625.3	455.6	41,046	177.4	131.6	15,675	67.7	47.4	-	-	-	8,909	38.5	25.6	10,134	43.8	30.6	8,211	35.5	25.3
民國100年	152,030	655.5	462.4	42,559	183.5	132.2	16,513	71.2	47.9	-	-	-	9,047	39.0	24.8	10,823	46.7	31.3	9,081	39.2	26.9
民國101年	153,823	661.0	450.6	43,665	187.6	131.3	17,121	73.6	47.9	-	-	-	9,314	40.0	24.4	11,061	47.5	30.8	9,281	39.9	26.5
民國102年	154,374	661.3	435.3	44,791	191.9	130.4	17,694	75.8	47.7	-	-	-	9,042	38.7	22.5	11,313	48.5	30.3	9,438	40.4	25.8
民國103年	162,886	696.0	443.5	46,093	196.9	130.2	19,399	82.9	50.2	-	-	-	10,353	44.2	24.7	11,733	50.1	30.4	9,846	42.1	26.0
民國104年	163,574	697.2	431.5	46,829	199.6	128.0	19,202	81.8	48.1	-	-	-	10,761	45.9	24.6	11,169	47.6	27.9	9,530	40.6	24.3
民國105年	172,418	733.2	439.4	47,760	203.1	126.8	20,812	88.5	50.3	-	-	-	12,212	51.9	26.9	11,846	50.4	28.6	9,960	42.4	24.5
民國106年	171,857	729.6	424.3	48,037	203.9	123.4	20,644	87.6	48.5	-	-	-	12,480	53.0	26.5	11,755	49.9	27.5	9,845	41.8	23.5
民國107年	172,859	733.1	415.0	48,784	206.9	121.8	21,569	91.5	48.8	-	-	-	13,421	56.9	27.4	11,520	48.9	26.1	9,374	39.8	21.5

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

4. 109年COVID-19死亡人數28人(含國人國外死亡21人)；110年COVID-19死亡人數896人(含國人國外死亡57人)；111年COVID-19死亡人數14,667人(含國人國外死亡50人)。

附表1 歷年主要死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	高血壓性疾病			事故傷害			慢性下呼吸道疾病			腎炎、腎病症候群 及腎病變			慢性肝病及肝硬化			蓄意自我傷害(自殺)			血管性及未明示之失智症		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	3,551	15.4	11.5	7,077	30.8	27.0	5,875	25.5	18.5	3,495	15.2	11.5	5,116	22.2	17.7	4,128	17.9	15.2	690	3.0	2.1
民國98年	3,768	16.3	11.7	7,358	31.9	27.7	5,417	23.5	16.2	3,483	15.1	10.9	5,117	22.2	17.3	4,063	17.6	14.7	810	3.5	2.3
民國99年	4,227	18.3	12.5	6,669	28.8	24.4	5,682	24.6	16.2	3,576	15.5	10.8	5,111	22.1	16.8	3,889	16.8	13.8	859	3.7	2.3
民國100年	4,690	20.2	13.2	6,726	29.0	24.1	6,542	28.2	17.7	3,805	16.4	11.0	5,362	23.1	17.2	3,507	15.1	12.3	1,069	4.6	2.7
民國101年	5,049	21.7	13.6	6,873	29.5	23.8	6,916	29.7	17.9	3,769	16.2	10.6	5,177	22.2	16.2	3,766	16.2	13.1	1,242	5.3	3.0
民國102年	5,097	21.8	13.1	6,619	28.4	22.4	6,515	27.9	16.2	3,910	16.8	10.4	5,039	21.6	15.3	3,565	15.3	12.0	1,407	6.0	3.2
民國103年	5,528	23.6	13.7	7,118	30.4	23.7	7,027	30.0	16.7	4,240	18.1	10.9	5,163	22.1	15.4	3,542	15.1	11.8	1,663	7.1	3.6
民國104年	5,606	23.9	13.5	7,033	30.0	22.8	6,978	29.7	15.9	4,148	17.7	10.3	4,878	20.8	14.2	3,675	15.7	12.1	1,992	8.5	4.1
民國105年	5,956	25.3	13.8	7,206	30.6	23.1	7,420	31.6	16.5	4,552	19.4	10.8	4,930	21.0	13.9	3,765	16.0	12.3	2,362	10.0	4.6
民國106年	6,149	26.1	13.6	6,965	29.6	21.9	6,844	29.1	14.5	4,687	19.9	10.8	4,739	20.1	13.1	3,871	16.4	12.5	2,506	10.6	4.8
民國107年	6,067	25.7	13.0	6,846	29.0	21.1	6,719	28.5	13.9	4,811	20.4	10.7	4,490	19.0	12.1	3,865	16.4	12.5	2,215	9.4	4.1
民國108年	6,255	26.5	12.9	6,640	28.1	20.0	6,301	26.7	12.6	5,049	21.4	10.7	4,240	18.0	11.2	3,864	16.4	12.6	2,625	11.1	4.7
民國109年	6,706	28.4	13.4	6,767	28.7	20.3	5,657	24.0	11.0	5,096	21.6	10.5	3,964	16.8	10.3	3,656	15.5	11.8	2,885	12.2	5.0
民國110年	7,886	33.6	15.2	6,775	28.9	20.0	6,238	26.6	11.7	5,470	23.3	10.9	4,065	17.3	10.4	3,585	15.3	11.6	3,180	13.6	5.4
民國111年	8,720	37.4	16.3	6,953	29.8	20.0	6,494	27.8	11.8	5,813	24.9	11.3	4,107	17.6	10.4	3,787	16.2	12.3	3,487	15.0	5.8
轉換比值	1.0127	1.0127	1.0215	1.0000	1.0000	1.0000	1.0932	1.0932	1.0913	0.8711	0.8711	0.8714	1.0406	1.0406	1.0393	1.0000	1.0000	1.0000	1.4563	1.4563	1.4592
原發布數																					
民國97年	3,507	15.2	11.2	7,077	30.8	27.0	5,374	23.4	16.9	4,012	17.4	13.2	4,917	21.4	17.1	4,128	17.9	15.2	474	2.1	1.4
民國98年	3,721	16.1	11.5	7,358	31.9	27.7	4,955	21.5	14.9	3,999	17.3	12.5	4,918	21.3	16.6	4,063	17.6	14.7	556	2.4	1.6
民國99年	4,174	18.0	12.2	6,669	28.8	24.4	5,197	22.5	14.8	4,105	17.7	12.4	4,912	21.2	16.1	3,889	16.8	13.8	590	2.5	1.6
民國100年	4,631	20.0	12.9	6,726	29.0	24.1	5,984	25.8	16.2	4,368	18.8	12.6	5,153	22.2	16.5	3,507	15.1	12.3	734	3.2	1.9
民國101年	4,986	21.4	13.3	6,873	29.5	23.8	6,326	27.2	16.4	4,327	18.6	12.1	4,975	21.4	15.6	3,766	16.2	13.1	853	3.7	2.0
民國102年	5,033	21.6	12.9	6,619	28.4	22.4	5,959	25.5	14.9	4,489	19.2	11.9	4,843	20.7	14.8	3,565	15.3	12.0	966	4.1	2.2
民國103年	5,459	23.3	13.5	7,118	30.4	23.7	6,428	27.5	15.3	4,868	20.8	12.5	4,962	21.2	14.8	3,542	15.1	11.8	1,142	4.9	2.5
民國104年	5,536	23.6	13.2	7,033	30.0	22.8	6,383	27.2	14.6	4,762	20.3	11.8	4,688	20.0	13.6	3,675	15.7	12.1	1,368	5.8	2.8
民國105年	5,881	25.0	13.5	7,206	30.6	23.1	6,787	28.9	15.1	5,226	22.2	12.4	4,738	20.1	13.4	3,765	16.0	12.3	1,622	6.9	3.2
民國106年	6,072	25.8	13.3	6,965	29.6	21.9	6,260	26.6	13.3	5,381	22.8	12.4	4,554	19.3	12.6	3,871	16.4	12.5	1,721	7.3	3.3
民國107年	5,991	25.4	12.8	6,846	29.0	21.1	6,146	26.1	12.7	5,523	23.4	12.3	4,315	18.3	11.6	3,865	16.4	12.5	1,521	6.5	2.8

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表1 歷年主要死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	衰老/老邁			敗血症			帕金森病			骨骼肌肉系統 及結締組織之疾病			原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)			主動脈瘤及剝離			肇因於吸入外物之肺部病 況		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	2,498	10.9	7.8	2,792	12.1	9.0	565	2.5	1.8	1,406	6.1	4.7	1,326	5.8	4.5	655	2.8	2.2	424	1.8	1.3
民國98年	2,289	9.9	6.7	2,862	12.4	8.9	594	2.6	1.8	1,441	6.2	4.6	1,125	4.9	3.6	598	2.6	1.9	382	1.7	1.2
民國99年	2,348	10.1	6.5	2,990	12.9	8.9	647	2.8	1.8	1,682	7.3	5.1	957	4.1	2.9	674	2.9	2.1	386	1.7	1.1
民國100年	2,326	10.0	6.0	3,070	13.2	8.6	791	3.4	2.2	1,403	6.1	4.3	1,054	4.5	3.1	648	2.8	1.9	409	1.8	1.1
民國101年	2,102	9.0	5.1	2,900	12.5	7.8	887	3.8	2.3	1,364	5.9	4.0	1,078	4.6	3.1	706	3.0	2.1	409	1.8	1.1
民國102年	2,023	8.7	4.6	2,723	11.7	7.1	972	4.2	2.5	1,388	5.9	3.9	1,177	5.0	3.2	734	3.1	2.0	395	1.7	1.0
民國103年	2,258	9.6	4.9	2,714	11.6	6.8	984	4.2	2.4	1,761	7.5	4.7	1,341	5.7	3.6	795	3.4	2.2	400	1.7	1.0
民國104年	2,227	9.5	4.6	2,708	11.5	6.5	1,100	4.7	2.6	1,781	7.6	4.6	1,370	5.8	3.5	740	3.2	1.9	414	1.8	1.0
民國105年	2,396	10.2	4.7	2,992	12.7	6.9	1,212	5.2	2.7	1,880	8.0	4.6	1,372	5.8	3.4	827	3.5	2.1	454	1.9	1.0
民國106年	2,405	10.2	4.5	2,964	12.6	6.6	1,217	5.2	2.7	1,544	6.6	3.8	1,489	6.3	3.5	806	3.4	2.0	433	1.8	0.9
民國107年	2,300	9.8	4.2	2,981	12.6	6.6	1,223	5.2	2.6	1,273	5.4	3.2	1,415	6.0	3.3	878	3.7	2.1	453	1.9	0.9
民國108年	2,199	9.3	3.9	2,925	12.4	6.1	1,365	5.8	2.8	1,299	5.5	3.2	1,447	6.1	3.3	907	3.8	2.1	518	2.2	1.0
民國109年	2,385	10.1	4.0	1,931	8.2	4.0	1,321	5.6	2.6	1,307	5.5	3.1	1,514	6.4	3.2	914	3.9	2.1	724	3.1	1.4
民國110年	2,758	11.8	4.5	2,222	9.5	4.5	1,600	6.8	3.1	1,498	6.4	3.4	1,522	6.5	3.2	950	4.0	2.1	867	3.7	1.6
民國111年	3,049	13.1	4.9	2,345	10.1	4.7	1,663	7.1	3.1	1,612	6.9	3.5	1,506	6.5	3.2	968	4.2	2.1	954	4.1	1.8
轉換比值	1.5467	1.5467	1.5795	0.7901	0.7901	0.7819	1.0382	1.0382	1.0352	1.0965	1.0965	1.0976	0.9881	0.9881	0.9856	0.9887	0.9887	0.9889	0.7023	0.7023	0.7012
原發布數																					
民國97年	1,615	7.0	4.9	3,534	15.4	11.6	544	2.4	1.7	1,282	5.6	4.3	1,342	5.8	4.5	662	2.9	2.2	603	2.6	1.9
民國98年	1,480	6.4	4.3	3,623	15.7	11.4	572	2.5	1.7	1,314	5.7	4.2	1,139	4.9	3.6	605	2.6	1.9	544	2.4	1.7
民國99年	1,518	6.6	4.1	3,784	16.4	11.3	623	2.7	1.8	1,534	6.6	4.6	968	4.2	3.0	682	2.9	2.1	550	2.4	1.6
民國100年	1,504	6.5	3.8	3,886	16.8	11.0	762	3.3	2.1	1,280	5.5	3.9	1,067	4.6	3.2	655	2.8	2.0	582	2.5	1.6
民國101年	1,359	5.8	3.2	3,671	15.8	10.0	854	3.7	2.3	1,244	5.3	3.7	1,091	4.7	3.1	714	3.1	2.1	583	2.5	1.5
民國102年	1,308	5.6	2.9	3,446	14.8	9.0	936	4.0	2.4	1,266	5.4	3.6	1,191	5.1	3.2	742	3.2	2.1	562	2.4	1.4
民國103年	1,460	6.2	3.1	3,435	14.7	8.7	948	4.1	2.3	1,606	6.9	4.3	1,357	5.8	3.6	804	3.4	2.2	570	2.4	1.4
民國104年	1,440	6.1	2.9	3,428	14.6	8.3	1,060	4.5	2.5	1,624	6.9	4.2	1,386	5.9	3.5	748	3.2	2.0	589	2.5	1.4
民國105年	1,549	6.6	3.0	3,787	16.1	8.9	1,167	5.0	2.6	1,715	7.3	4.2	1,388	5.9	3.4	836	3.6	2.2	646	2.7	1.4
民國106年	1,555	6.6	2.9	3,752	15.9	8.5	1,172	5.0	2.6	1,408	6.0	3.5	1,507	6.4	3.6	815	3.5	2.0	616	2.6	1.3
民國107年	1,487	6.3	2.6	3,773	16.0	8.4	1,178	5.0	2.5	1,161	4.9	2.9	1,432	6.1	3.3	888	3.8	2.1	645	2.7	1.3

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表2 歷年男性主要死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	所有死亡原因			惡性腫瘤			心臟疾病 (高血壓性疾病除外)			肺炎			嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)			腦血管疾病			糖尿病			
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	
經轉換比值調整後值																						
民國97年	87,682	754.7	608.6	25,240	217.3	176.2	8,555	73.6	58.2	5,794	49.9	37.6	-	-	-	6,676	57.5	45.1	4,138	35.6	28.6	
民國98年	87,074	748.6	586.6	25,555	219.7	173.3	8,196	70.5	54.2	5,494	47.2	34.2	-	-	-	6,611	56.8	43.2	4,235	36.4	28.4	
民國99年	88,374	759.5	576.2	26,301	226.0	173.0	8,557	73.5	54.6	5,834	50.1	34.8	-	-	-	6,402	55.0	40.4	4,246	36.5	27.3	
民國100年	93,155	800.3	590.6	27,335	234.8	175.5	9,028	77.6	55.7	5,943	51.1	34.1	-	-	-	6,866	59.0	42.0	4,687	40.3	29.4	
民國101年	93,197	799.3	573.1	27,563	236.4	172.1	9,344	80.1	56.1	6,043	51.8	33.3	-	-	-	6,899	59.2	41.1	4,808	41.2	29.3	
民國102年	93,340	799.2	556.6	28,182	241.3	171.1	9,624	82.4	56.1	5,955	51.0	31.5	-	-	-	7,085	60.7	40.7	4,864	41.6	28.7	
民國103年	97,979	838.0	569.1	28,782	246.2	170.5	10,467	89.5	59.1	6,610	56.5	34.0	-	-	-	7,494	64.1	42.0	5,105	43.7	29.3	
民國104年	98,230	839.2	557.2	29,085	248.5	168.0	10,248	87.6	56.6	6,897	58.9	34.3	-	-	-	7,074	60.4	38.7	5,073	43.3	28.4	
民國105年	102,985	879.0	569.1	29,529	252.0	166.3	11,151	95.2	60.1	7,822	66.8	37.9	-	-	-	7,425	63.4	39.6	5,246	44.8	28.5	
民國106年	101,686	867.7	548.5	29,661	253.1	162.4	10,976	93.7	57.9	7,923	67.6	37.4	-	-	-	7,387	63.0	38.4	5,158	44.0	27.5	
民國107年	101,949	870.2	538.4	29,942	255.6	160.1	11,453	97.8	58.6	8,386	71.6	38.6	-	-	-	7,251	61.9	36.8	4,884	41.7	25.3	
民國108年	103,004	879.7	531.7	30,543	260.8	158.8	11,375	97.1	56.9	8,935	76.3	40.4	-	-	-	7,009	59.9	34.7	5,044	43.1	25.4	
民國109年	101,385	867.3	511.0	30,250	258.8	152.6	11,809	101.0	57.9	8,220	70.3	36.5	22 ^{註4}	0.2	0.1	6,933	59.3	33.7	5,260	45.0	25.6	
民國110年	107,064	920.9	530.1	31,121	267.7	154.0	12,639	108.7	61.1	8,058	69.3	35.1	581 ^{註4}	5.0	2.8	7,083	60.9	33.3	5,778	49.7	27.6	
民國111年	120,405	1,043.5	583.5	31,158	270.0	151.4	13,530	117.3	64.0	8,567	74.2	37.2	8,381 ^{註4}	72.6	38.1	7,143	61.9	33.3	6,301	54.6	29.4	
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0107	1.0107	1.0101	0.9114	0.9114	0.9169	1.0484	1.0484	1.0470	-	-	-	1.0736	1.0736	1.0731	1.0454	1.0454	1.0453	
原發布數																						
民國97年	87,682	754.7	608.6	24,972	215.0	174.4	9,386	80.8	63.5	5,527	47.6	35.9	-	-	-	6,218	53.5	42.0	3,958	34.1	27.4	
民國98年	87,074	748.6	586.6	25,284	217.4	171.6	8,992	77.3	59.1	5,240	45.0	32.7	-	-	-	6,158	52.9	40.3	4,051	34.8	27.2	
民國99年	88,374	759.5	576.2	26,022	223.6	171.3	9,389	80.7	59.6	5,565	47.8	33.3	-	-	-	5,963	51.2	37.6	4,062	34.9	26.1	
民國100年	93,155	800.3	590.6	27,045	232.3	173.7	9,905	85.1	60.7	5,669	48.7	32.5	-	-	-	6,395	54.9	39.1	4,484	38.5	28.1	
民國101年	93,197	799.3	573.1	27,270	233.9	170.4	10,252	87.9	61.1	5,764	49.4	31.8	-	-	-	6,426	55.1	38.3	4,599	39.4	28.0	
民國102年	93,340	799.2	556.6	27,883	238.7	169.4	10,559	90.4	61.2	5,680	48.6	30.1	-	-	-	6,599	56.5	38.0	4,653	39.8	27.5	
民國103年	97,979	838.0	569.1	28,476	243.6	168.8	11,484	98.2	64.5	6,305	53.9	32.4	-	-	-	6,980	59.7	39.1	4,883	41.8	28.1	
民國104年	98,230	839.2	557.2	28,776	245.8	166.3	11,244	96.1	61.7	6,579	56.2	32.8	-	-	-	6,589	56.3	36.1	4,853	41.5	27.2	
民國105年	102,985	879.0	569.1	29,215	249.4	164.6	12,235	104.4	65.5	7,461	63.7	36.2	-	-	-	6,916	59.0	36.9	5,018	42.8	27.3	
民國106年	101,686	867.7	548.5	29,346	250.4	160.8	12,043	102.8	63.2	7,557	64.5	35.8	-	-	-	6,881	58.7	35.7	4,934	42.1	26.3	
民國107年	101,949	870.2	538.4	29,624	252.8	158.5	12,566	107.3	63.9	7,999	68.3	36.9	-	-	-	6,754	57.6	34.3	4,672	39.9	24.2	

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

4. 109年COVID-19死亡人數22人(含國人國外死亡16人)；110年COVID-19死亡人數581人(含國人國外死亡43人)；111年COVID-19死亡人數8,381人(含國人國外死亡31人)。

附表2 歷年男性主要死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	事故傷害			慢性下呼吸道疾病			高血壓性疾病			慢性肝病及肝硬化			腎炎、腎病症候群及腎病變			蓄意自我傷害(自殺)			血管性及未明示之失智症		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	5,239	45.1	39.9	4,329	37.3	27.7	1,827	15.7	12.2	3,704	31.9	26.0	1,759	15.1	11.9	2,820	24.3	20.8	318	2.7	2.0
民國98年	5,354	46.0	40.3	4,032	34.7	24.8	1,994	17.1	12.9	3,602	31.0	24.8	1,831	15.7	11.8	2,798	24.1	20.3	360	3.1	2.1
民國99年	4,835	41.6	35.8	4,182	35.9	24.6	2,173	18.7	13.6	3,634	31.2	24.6	1,821	15.6	11.5	2,639	22.7	18.8	404	3.5	2.3
民國100年	4,875	41.9	35.5	4,820	41.4	27.2	2,500	21.5	15.0	3,862	33.2	25.6	1,910	16.4	11.6	2,392	20.5	16.9	470	4.0	2.5
民國101年	4,950	42.5	34.9	5,125	44.0	27.8	2,569	22.0	14.8	3,700	31.7	24.1	1,953	16.8	11.5	2,430	20.8	17.0	556	4.8	2.8
民國102年	4,733	40.5	32.8	4,822	41.3	25.3	2,589	22.2	14.5	3,639	31.2	23.2	1,968	16.9	11.1	2,388	20.4	16.3	624	5.3	3.1
民國103年	5,108	43.7	35.0	5,139	44.0	26.1	2,885	24.7	15.7	3,686	31.5	23.1	2,216	19.0	12.2	2,362	20.2	15.9	734	6.3	3.5
民國104年	5,096	43.5	34.3	5,178	44.2	25.6	2,914	24.9	15.6	3,474	29.7	21.3	2,104	18.0	11.3	2,426	20.7	16.3	907	7.7	4.1
民國105年	5,224	44.6	34.9	5,394	46.0	26.3	3,127	26.7	16.2	3,526	30.1	21.2	2,281	19.5	11.8	2,559	21.8	17.0	1,086	9.3	4.7
民國106年	4,923	42.0	32.4	4,907	41.9	23.2	3,156	26.9	15.9	3,311	28.3	19.7	2,306	19.7	11.7	2,574	22.0	16.9	1,142	9.7	4.9
民國107年	4,803	41.0	31.1	4,892	41.8	22.7	3,072	26.2	15.1	3,172	27.1	18.4	2,432	20.8	12.1	2,551	21.8	16.6	1,012	8.6	4.3
民國108年	4,701	40.1	30.0	4,546	38.8	20.6	3,104	26.5	14.9	3,011	25.7	17.3	2,583	22.1	12.4	2,554	21.8	16.9	1,178	10.1	4.9
民國109年	4,743	40.6	29.9	4,097	35.0	18.2	3,410	29.2	16.0	2,872	24.6	16.3	2,549	21.8	12.0	2,404	20.6	15.6	1,267	10.8	5.2
民國110年	4,717	40.6	29.4	4,382	37.7	19.1	3,999	34.4	18.3	2,918	25.1	16.3	2,751	23.7	12.7	2,330	20.0	15.2	1,375	11.8	5.6
民國111年	4,823	41.8	29.9	4,584	39.7	19.7	4,322	37.5	19.4	2,950	25.6	16.4	2,932	25.4	13.2	2,419	21.0	15.9	1,555	13.5	6.3
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0939	1.0939	1.0933	1.0213	1.0213	1.0311	1.0359	1.0359	1.0359	0.8720	0.8720	0.8715	1.0000	1.0000	1.0000	1.4795	1.4795	1.4847
原發布數																					
民國97年	5,239	45.1	39.9	3,957	34.1	25.3	1,789	15.4	11.9	3,576	30.8	25.1	2,017	17.4	13.7	2,820	24.3	20.8	215	1.9	1.3
民國98年	5,354	46.0	40.3	3,686	31.7	22.6	1,952	16.8	12.5	3,477	29.9	24.0	2,100	18.1	13.5	2,798	24.1	20.3	243	2.1	1.4
民國99年	4,835	41.6	35.8	3,823	32.9	22.5	2,128	18.3	13.1	3,508	30.1	23.7	2,088	17.9	13.1	2,639	22.7	18.8	273	2.3	1.5
民國100年	4,875	41.9	35.5	4,406	37.9	24.8	2,448	21.0	14.5	3,728	32.0	24.7	2,190	18.8	13.3	2,392	20.5	16.9	318	2.7	1.7
民國101年	4,950	42.5	34.9	4,685	40.2	25.5	2,515	21.6	14.3	3,572	30.6	23.3	2,240	19.2	13.2	2,430	20.8	17.0	376	3.2	1.9
民國102年	4,733	40.5	32.8	4,408	37.7	23.2	2,535	21.7	14.1	3,513	30.1	22.4	2,257	19.3	12.8	2,388	20.4	16.3	422	3.6	2.1
民國103年	5,108	43.7	35.0	4,698	40.2	23.9	2,825	24.2	15.2	3,558	30.4	22.3	2,541	21.7	14.0	2,362	20.2	15.9	496	4.2	2.4
民國104年	5,096	43.5	34.3	4,733	40.4	23.4	2,853	24.4	15.1	3,354	28.7	20.6	2,413	20.6	12.9	2,426	20.7	16.3	613	5.2	2.8
民國105年	5,224	44.6	34.9	4,931	42.1	24.0	3,062	26.1	15.7	3,404	29.1	20.5	2,616	22.3	13.6	2,559	21.8	17.0	734	6.3	3.2
民國106年	4,923	42.0	32.4	4,486	38.3	21.2	3,090	26.4	15.4	3,196	27.3	19.0	2,644	22.6	13.4	2,574	22.0	16.9	772	6.6	3.3
民國107年	4,803	41.0	31.1	4,472	38.2	20.8	3,008	25.7	14.6	3,062	26.1	17.8	2,789	23.8	13.8	2,551	21.8	16.6	684	5.8	2.9

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表2 歷年男性主要死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	衰老/老邁			敗血症			帕金森病			原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)			骨骼肌肉系統 及結締組織之疾病			主動脈瘤及剝離			肇因於吸入外物之肺部病 況		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,218	10.5	7.9	1,494	12.9	9.9	346	3.0	2.2	825	7.1	5.6	693	6.0	4.7	479	4.1	3.2	245	2.1	1.6
民國98年	1,026	8.8	6.3	1,525	13.1	9.8	361	3.1	2.2	650	5.6	4.3	655	5.6	4.3	410	3.5	2.7	224	1.9	1.4
民國99年	1,129	9.7	6.5	1,575	13.5	9.7	376	3.2	2.2	561	4.8	3.5	777	6.7	4.9	477	4.1	3.1	233	2.0	1.4
民國100年	1,123	9.6	6.3	1,775	15.3	10.5	461	4.0	2.6	580	5.0	3.6	689	5.9	4.3	454	3.9	2.8	258	2.2	1.5
民國101年	976	8.4	5.1	1,650	14.2	9.4	508	4.4	2.8	604	5.2	3.6	657	5.6	4.0	480	4.1	2.9	247	2.1	1.4
民國102年	921	7.9	4.5	1,610	13.8	8.9	541	4.6	2.9	700	6.0	4.0	678	5.8	4.0	505	4.3	3.0	239	2.0	1.3
民國103年	1,000	8.6	4.7	1,545	13.2	8.4	562	4.8	2.9	754	6.4	4.2	843	7.2	4.7	526	4.5	3.0	242	2.1	1.2
民國104年	1,068	9.1	4.9	1,609	13.7	8.3	629	5.4	3.2	819	7.0	4.5	810	6.9	4.5	486	4.2	2.7	239	2.0	1.2
民國105年	1,145	9.8	5.1	1,697	14.5	8.7	697	6.0	3.4	790	6.7	4.2	871	7.4	4.7	587	5.0	3.3	268	2.3	1.3
民國106年	1,070	9.1	4.5	1,702	14.5	8.5	661	5.6	3.2	876	7.5	4.5	728	6.2	3.9	561	4.8	3.0	243	2.1	1.2
民國107年	1,026	8.8	4.3	1,711	14.6	8.5	690	5.9	3.3	821	7.0	4.2	600	5.1	3.2	575	4.9	3.1	262	2.2	1.2
民國108年	1,015	8.7	4.2	1,642	14.0	7.8	773	6.6	3.6	814	7.0	4.0	627	5.4	3.3	624	5.3	3.2	287	2.5	1.3
民國109年	1,061	9.1	4.2	1,016	8.7	4.8	723	6.2	3.3	860	7.4	4.1	636	5.4	3.3	584	5.0	3.0	400	3.4	1.8
民國110年	1,251	10.8	4.9	1,167	10.0	5.5	838	7.2	3.7	849	7.3	4.0	706	6.1	3.5	612	5.3	3.1	469	4.0	2.1
民國111年	1,354	11.7	5.3	1,212	10.5	5.6	886	7.7	3.9	837	7.3	4.0	801	6.9	3.9	656	5.7	3.2	550	4.8	2.4
轉換比值	1.6132	1.6132	1.6556	0.7739	0.7739	0.7693	1.0360	1.0360	1.0336	0.9868	0.9868	0.9864	1.0830	1.0830	1.0867	0.9914	0.9914	0.9905	0.6987	0.6987	0.7010
原發布數																					
民國97年	755	6.5	4.7	1,930	16.6	12.9	334	2.9	2.1	836	7.2	5.7	640	5.5	4.3	483	4.2	3.3	351	3.0	2.3
民國98年	636	5.5	3.8	1,971	16.9	12.8	348	3.0	2.1	659	5.7	4.4	605	5.2	3.9	414	3.6	2.7	321	2.8	2.0
民國99年	700	6.0	3.9	2,035	17.5	12.6	363	3.1	2.1	569	4.9	3.6	717	6.2	4.5	481	4.1	3.1	333	2.9	2.0
民國100年	696	6.0	3.8	2,294	19.7	13.6	445	3.8	2.5	588	5.1	3.6	636	5.5	4.0	458	3.9	2.8	369	3.2	2.1
民國101年	605	5.2	3.1	2,132	18.3	12.2	490	4.2	2.7	612	5.2	3.7	607	5.2	3.7	484	4.2	2.9	353	3.0	1.9
民國102年	571	4.9	2.7	2,081	17.8	11.6	522	4.5	2.8	709	6.1	4.1	626	5.4	3.7	509	4.4	3.0	342	2.9	1.8
民國103年	620	5.3	2.8	1,997	17.1	10.9	542	4.6	2.8	764	6.5	4.3	778	6.7	4.3	531	4.5	3.1	347	3.0	1.8
民國104年	662	5.7	2.9	2,079	17.8	10.9	607	5.2	3.1	830	7.1	4.6	748	6.4	4.1	490	4.2	2.8	342	2.9	1.7
民國105年	710	6.1	3.1	2,193	18.7	11.3	673	5.7	3.3	801	6.8	4.3	804	6.9	4.3	592	5.1	3.3	383	3.3	1.9
民國106年	663	5.7	2.7	2,200	18.8	11.0	638	5.4	3.1	888	7.6	4.6	672	5.7	3.6	566	4.8	3.0	348	3.0	1.6
民國107年	636	5.4	2.6	2,211	18.9	11.0	666	5.7	3.2	832	7.1	4.3	554	4.7	2.9	580	5.0	3.1	375	3.2	1.7

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表3 歷年女性主要死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	所有死亡原因			惡性腫瘤			心臟疾病 (高血壓性疾病除外)			嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)			糖尿病			肺炎			腦血管疾病		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	54,601	479.8	362.5	14,105	123.9	95.4	5,762	50.6	36.8	-	-	-	4,274	37.6	27.9	3,371	29.5	20.8	4,864	42.7	30.8
民國98年	55,166	481.9	350.5	14,806	129.3	96.1	5,546	48.5	33.5	-	-	-	4,380	38.3	27.4	3,350	29.2	19.4	4,626	40.4	28.0
民國99年	56,335	489.7	339.9	15,201	132.1	94.9	5,714	49.7	32.8	-	-	-	4,350	37.8	25.6	3,593	31.2	19.7	4,565	39.7	26.2
民國100年	58,875	509.6	340.6	15,697	135.9	94.4	6,006	52.0	32.7	-	-	-	4,819	41.7	27.0	3,630	31.4	18.8	4,847	41.9	26.3
民國101年	60,626	522.1	335.4	16,587	142.9	96.1	6,243	53.8	32.5	-	-	-	4,908	42.3	26.2	3,813	32.8	18.8	5,071	43.7	26.1
民國102年	61,034	523.2	322.0	17,107	146.6	95.7	6,485	55.6	32.1	-	-	-	5,016	43.0	25.5	3,613	30.9	16.6	5,158	44.2	25.4
民國103年	64,907	554.2	327.2	17,823	152.2	95.9	7,194	61.4	33.8	-	-	-	5,202	44.4	25.3	4,345	37.1	19.0	5,204	44.4	24.5
民國104年	65,344	555.7	316.1	18,264	155.3	94.4	7,234	61.5	32.4	-	-	-	4,903	41.7	22.7	4,490	38.2	18.7	5,013	42.6	22.5
民國105年	69,433	588.4	321.2	18,762	159.0	93.8	7,797	66.1	33.3	-	-	-	5,180	43.9	23.0	5,101	43.2	20.2	5,395	45.7	23.1
民國106年	70,171	592.9	312.2	18,910	159.8	91.2	7,819	66.1	32.0	-	-	-	5,148	43.5	21.9	5,283	44.6	20.0	5,334	45.1	22.0
民國107年	70,910	597.7	304.5	19,384	163.4	90.3	8,184	69.0	32.1	-	-	-	4,929	41.5	20.0	5,816	49.0	20.9	5,216	44.0	20.6
民國108年	72,420	609.2	297.8	19,689	165.6	88.5	8,484	71.4	31.4	-	-	-	4,952	41.7	19.2	6,250	52.6	21.5	5,167	43.5	19.5
民國109年	71,682	602.7	284.3	19,911	167.4	86.7	8,648	72.7	31.0	6 ^{註4}	0.1	0.0	5,051	42.5	18.6	5,516	46.4	18.1	4,888	41.1	17.9
民國110年	77,108	651.1	295.4	20,535	173.4	87.1	9,213	77.8	31.6	315 ^{註4}	2.7	1.2	5,672	47.9	20.2	5,491	46.4	17.5	5,099	43.1	18.1
民國111年	88,033	747.2	322.1	20,769	176.3	85.6	10,138	86.1	33.3	6,286 ^{註4}	53.4	20.8	5,988	50.8	20.3	5,753	48.8	17.7	5,273	44.8	17.9
轉換比值	1.0000	1.0000	1.0000	1.0117	1.0117	1.0107	0.9090	0.9090	0.9143	-	-	-	1.0483	1.0483	1.0516	1.0727	1.0727	1.0710	1.0944	1.0944	1.0917
原發布數																					
民國97年	54,601	479.8	362.5	13,941	122.5	94.4	6,340	55.7	40.2	-	-	-	4,078	35.8	26.5	3,134	27.5	19.4	4,445	39.1	28.2
民國98年	55,166	481.9	350.5	14,634	127.8	95.1	6,102	53.3	36.7	-	-	-	4,179	36.5	26.0	3,118	27.2	18.2	4,225	36.9	25.7
民國99年	56,335	489.7	339.9	15,024	130.6	93.9	6,286	54.6	35.9	-	-	-	4,149	36.1	24.4	3,344	29.1	18.4	4,171	36.3	24.0
民國100年	58,875	509.6	340.6	15,514	134.3	93.4	6,608	57.2	35.8	-	-	-	4,597	39.8	25.7	3,378	29.2	17.5	4,428	38.3	24.1
民國101年	60,626	522.1	335.4	16,395	141.2	95.1	6,869	59.2	35.5	-	-	-	4,682	40.3	24.9	3,550	30.6	17.5	4,635	39.9	23.9
民國102年	61,034	523.2	322.0	16,908	144.9	94.7	7,135	61.2	35.1	-	-	-	4,785	41.0	24.2	3,362	28.8	15.5	4,714	40.4	23.2
民國103年	64,907	554.2	327.2	17,617	150.4	94.9	7,915	67.6	37.0	-	-	-	4,963	42.4	24.0	4,048	34.6	17.8	4,753	40.6	22.4
民國104年	65,344	555.7	316.1	18,053	153.5	93.4	7,958	67.7	35.5	-	-	-	4,677	39.8	21.6	4,182	35.6	17.5	4,580	39.0	20.6
民國105年	69,433	588.4	321.2	18,545	157.2	92.8	8,577	72.7	36.4	-	-	-	4,942	41.9	21.9	4,751	40.3	18.9	4,930	41.8	21.2
民國106年	70,171	592.9	312.2	18,691	157.9	90.2	8,601	72.7	35.0	-	-	-	4,911	41.5	20.8	4,923	41.6	18.6	4,874	41.2	20.1
民國107年	70,910	597.7	304.5	19,160	161.5	89.3	9,003	75.9	35.1	-	-	-	4,702	39.6	19.0	5,422	45.7	19.5	4,766	40.2	18.9

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

4. 109年COVID-19死亡人數6人(含國人國外死亡5人)；110年COVID-19死亡人數315人(含國人國外死亡14人)；111年COVID-19死亡人數6,286人(含國人國外死亡19人)。

附表3 歷年女性主要死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	高血壓性疾病			腎炎、腎病症候群 及腎病變			事故傷害			血管性及未明示之失智症			慢性下呼吸道疾病			衰老/老邁			蓄意自我傷害(自殺)		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,724	15.2	10.7	1,736	15.3	11.2	1,838	16.2	14.1	372	3.3	2.2	1,546	13.6	9.5	1,280	11.3	7.7	1,308	11.5	9.7
民國98年	1,774	15.5	10.5	1,652	14.4	10.1	2,004	17.5	15.1	450	3.9	2.5	1,385	12.1	8.0	1,263	11.0	7.1	1,265	11.1	9.2
民國99年	2,054	17.9	11.4	1,755	15.3	10.2	1,834	15.9	13.1	455	4.0	2.4	1,500	13.0	8.2	1,219	10.6	6.5	1,250	10.9	8.8
民國100年	2,190	19.0	11.5	1,895	16.4	10.5	1,851	16.0	12.8	599	5.2	2.9	1,722	14.9	8.9	1,203	10.5	5.9	1,115	9.7	7.7
民國101年	2,480	21.4	12.4	1,816	15.6	9.7	1,923	16.6	12.8	686	5.9	3.1	1,791	15.4	8.8	1,126	9.7	5.2	1,336	11.5	9.3
民國102年	2,508	21.5	11.8	1,942	16.6	9.7	1,886	16.2	12.2	783	6.7	3.4	1,693	14.5	7.9	1,102	9.5	4.7	1,177	10.1	7.8
民國103年	2,643	22.6	11.9	2,024	17.3	9.7	2,010	17.2	12.8	929	7.9	3.8	1,888	16.1	8.3	1,258	10.7	5.0	1,180	10.1	7.7
民國104年	2,692	22.9	11.4	2,044	17.4	9.4	1,937	16.5	11.7	1,085	9.2	4.2	1,800	15.3	7.5	1,159	9.9	4.4	1,249	10.6	8.1
民國105年	2,829	24.0	11.5	2,271	19.2	9.9	1,982	16.8	11.6	1,276	10.8	4.6	2,026	17.2	8.1	1,251	10.6	4.5	1,206	10.2	7.7
民國106年	2,993	25.3	11.5	2,381	20.1	9.9	2,042	17.3	11.8	1,364	11.5	4.7	1,937	16.4	7.3	1,335	11.3	4.5	1,297	11.0	8.3
民國107年	2,995	25.2	11.1	2,379	20.1	9.4	2,043	17.2	11.5	1,203	10.1	4.0	1,827	15.4	6.7	1,274	10.7	4.1	1,314	11.1	8.5
民國108年	3,151	26.5	11.1	2,466	20.7	9.2	1,939	16.3	10.5	1,447	12.2	4.6	1,755	14.8	6.1	1,184	10.0	3.6	1,310	11.0	8.4
民國109年	3,296	27.7	11.0	2,547	21.4	9.2	2,024	17.0	11.1	1,618	13.6	4.9	1,560	13.1	5.3	1,324	11.1	3.8	1,252	10.5	8.3
民國110年	3,887	32.8	12.3	2,719	23.0	9.4	2,058	17.4	11.0	1,805	15.2	5.2	1,856	15.7	5.9	1,507	12.7	4.1	1,255	10.6	8.2
民國111年	4,398	37.3	13.4	2,881	24.5	9.7	2,130	18.1	10.6	1,932	16.4	5.4	1,910	16.2	5.8	1,695	14.4	4.5	1,368	11.6	8.8
轉換比值	1.0040	1.0040	1.0078	0.8702	0.8702	0.8709	1.0000	1.0000	1.0000	1.4373	1.4373	1.4372	1.0914	1.0914	1.0854	1.4971	1.4971	1.5190	1.0000	1.0000	1.0000
原發布數																					
民國97年	1,718	15.1	10.6	1,995	17.5	12.8	1,838	16.2	14.1	259	2.3	1.5	1,417	12.5	8.8	860	7.6	5.1	1,308	11.5	9.7
民國98年	1,769	15.5	10.5	1,899	16.6	11.6	2,004	17.5	15.1	313	2.7	1.7	1,269	11.1	7.4	844	7.4	4.7	1,265	11.1	9.2
民國99年	2,046	17.8	11.4	2,017	17.5	11.7	1,834	15.9	13.1	317	2.8	1.7	1,374	11.9	7.6	818	7.1	4.3	1,250	10.9	8.8
民國100年	2,183	18.9	11.4	2,178	18.9	12.0	1,851	16.0	12.8	416	3.6	2.0	1,578	13.7	8.2	808	7.0	3.9	1,115	9.7	7.7
民國101年	2,471	21.3	12.3	2,087	18.0	11.1	1,923	16.6	12.8	477	4.1	2.2	1,641	14.1	8.1	754	6.5	3.4	1,336	11.5	9.3
民國102年	2,498	21.4	11.7	2,232	19.1	11.2	1,886	16.2	12.2	544	4.7	2.4	1,551	13.3	7.3	737	6.3	3.1	1,177	10.1	7.8
民國103年	2,634	22.5	11.8	2,327	19.9	11.2	2,010	17.2	12.8	646	5.5	2.6	1,730	14.8	7.7	840	7.2	3.3	1,180	10.1	7.7
民國104年	2,683	22.8	11.4	2,349	20.0	10.8	1,937	16.5	11.7	755	6.4	2.9	1,650	14.0	6.9	778	6.6	2.9	1,249	10.6	8.1
民國105年	2,819	23.9	11.4	2,610	22.1	11.4	1,982	16.8	11.6	888	7.5	3.2	1,856	15.7	7.5	839	7.1	3.0	1,206	10.2	7.7
民國106年	2,982	25.2	11.4	2,737	23.1	11.4	2,042	17.3	11.8	949	8.0	3.3	1,774	15.0	6.7	892	7.5	3.0	1,297	11.0	8.3
民國107年	2,983	25.1	11.0	2,734	23.0	10.8	2,043	17.2	11.5	837	7.1	2.8	1,674	14.1	6.2	851	7.2	2.7	1,314	11.1	8.5

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表3 歷年女性主要死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	慢性肝病及肝硬化			敗血症			骨骼肌肉系統 及結締組織之疾病			帕金森病			原位與良性腫瘤 (惡性腫瘤除外)			肇因於吸入外物之肺部病 況			皮膚及皮下組織疾病		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值																					
民國97年	1,412	12.4	9.5	1,298	11.5	8.2	713	6.3	4.7	219	1.9	1.4	501	4.4	3.3	179	1.6	1.1	250	2.2	1.5
民國98年	1,515	13.2	9.8	1,337	11.7	8.0	786	6.9	4.9	233	2.0	1.4	475	4.2	2.9	158	1.4	1.0	245	2.1	1.4
民國99年	1,477	12.8	9.1	1,415	12.4	8.1	905	7.9	5.2	271	2.4	1.5	396	3.4	2.3	153	1.3	0.8	247	2.1	1.4
民國100年	1,500	13.0	8.9	1,295	11.2	6.9	714	6.2	4.2	330	2.9	1.7	474	4.1	2.7	151	1.3	0.8	275	2.4	1.5
民國101年	1,477	12.7	8.5	1,250	10.8	6.4	707	6.1	4.0	379	3.3	1.9	474	4.1	2.5	162	1.4	0.8	286	2.5	1.4
民國102年	1,400	12.0	7.7	1,113	9.5	5.4	710	6.1	3.8	431	3.7	2.1	477	4.1	2.4	156	1.3	0.7	246	2.1	1.2
民國103年	1,477	12.6	7.8	1,169	10.0	5.4	918	7.8	4.6	422	3.6	1.9	587	5.0	2.9	158	1.3	0.7	278	2.4	1.3
民國104年	1,404	11.9	7.2	1,099	9.3	4.9	971	8.3	4.7	471	4.0	2.1	551	4.7	2.6	175	1.5	0.7	282	2.4	1.3
民國105年	1,404	11.9	6.8	1,295	11.0	5.4	1,009	8.6	4.6	515	4.4	2.1	582	4.9	2.6	186	1.6	0.8	310	2.6	1.3
民國106年	1,428	12.1	6.7	1,262	10.7	5.0	816	6.9	3.7	556	4.7	2.2	613	5.2	2.6	190	1.6	0.7	251	2.1	1.0
民國107年	1,318	11.1	5.9	1,270	10.7	5.0	673	5.7	3.2	533	4.5	2.0	594	5.0	2.5	191	1.6	0.7	280	2.4	1.0
民國108年	1,229	10.3	5.3	1,283	10.8	4.7	672	5.7	3.1	592	5.0	2.2	633	5.3	2.6	231	1.9	0.8	253	2.1	0.9
民國109年	1,092	9.2	4.6	915	7.7	3.4	671	5.6	2.8	598	5.0	2.1	654	5.5	2.5	324	2.7	1.1	311	2.6	1.1
民國110年	1,147	9.7	4.7	1,055	8.9	3.7	792	6.7	3.3	762	6.4	2.6	673	5.7	2.5	398	3.4	1.3	348	2.9	1.2
民國111年	1,157	9.8	4.7	1,133	9.6	3.8	811	6.9	3.1	777	6.6	2.5	669	5.7	2.5	404	3.4	1.3	330	2.8	1.1
轉換比值	1.0519	1.0519	1.0486	0.8131	0.8131	0.8015	1.1087	1.1087	1.1077	1.0410	1.0410	1.0370	0.9900	0.9900	0.9820	0.7074	0.7074	0.7015	0.9929	0.9929	1.0005
原發布數																					
民國97年	1,341	11.8	9.1	1,604	14.1	10.2	642	5.6	4.2	210	1.8	1.3	506	4.4	3.3	252	2.2	1.6	251	2.2	1.5
民國98年	1,441	12.6	9.4	1,652	14.4	10.0	709	6.2	4.4	224	2.0	1.3	480	4.2	3.0	223	1.9	1.4	247	2.2	1.4
民國99年	1,404	12.2	8.7	1,749	15.2	10.1	817	7.1	4.7	260	2.3	1.5	399	3.5	2.4	217	1.9	1.2	249	2.2	1.4
民國100年	1,425	12.3	8.5	1,592	13.8	8.6	644	5.6	3.8	317	2.7	1.7	479	4.1	2.7	213	1.8	1.1	277	2.4	1.5
民國101年	1,403	12.1	8.1	1,539	13.3	7.9	637	5.5	3.6	364	3.1	1.9	479	4.1	2.6	230	2.0	1.1	288	2.5	1.4
民國102年	1,330	11.4	7.4	1,365	11.7	6.7	640	5.5	3.4	414	3.5	2.0	482	4.1	2.5	220	1.9	1.0	248	2.1	1.2
民國103年	1,404	12.0	7.5	1,438	12.3	6.7	828	7.1	4.2	406	3.5	1.9	593	5.1	3.0	223	1.9	1.0	280	2.4	1.3
民國104年	1,334	11.3	6.8	1,349	11.5	6.1	876	7.5	4.2	453	3.9	2.0	556	4.7	2.7	247	2.1	1.0	284	2.4	1.3
民國105年	1,334	11.3	6.5	1,594	13.5	6.8	911	7.7	4.1	494	4.2	2.0	587	5.0	2.6	263	2.2	1.1	312	2.6	1.3
民國106年	1,358	11.5	6.4	1,552	13.1	6.3	736	6.2	3.3	534	4.5	2.1	619	5.2	2.7	268	2.3	1.0	252	2.1	1.0
民國107年	1,253	10.6	5.7	1,562	13.2	6.2	607	5.1	2.9	512	4.3	1.9	600	5.1	2.5	270	2.3	1.0	282	2.4	1.0

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表4 歷年主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	氣管、支氣管和肺癌			肝和肝內膽管癌			結腸、直腸和肛門癌			女性乳癌			前列腺(攝護腺)癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	7,850	34.1	26.5	7,721	33.6	27.0	4,466	19.4	15.0	1,600	14.1	11.1	942	8.1	6.1
民國98年	8,026	34.8	26.2	7,830	33.9	26.4	4,743	20.6	15.4	1,650	14.4	11.0	988	8.5	6.2
民國99年	8,271	35.7	26.0	7,815	33.8	25.4	4,895	21.2	15.3	1,772	15.4	11.4	1,078	9.3	6.5
民國100年	8,621	37.2	26.3	8,095	34.9	25.5	5,152	22.2	15.6	1,923	16.6	12.0	1,157	9.9	6.8
民國101年	8,667	37.2	25.6	8,190	35.2	24.9	5,372	23.1	15.6	1,986	17.1	12.0	1,253	10.7	7.1
民國102年	8,937	38.3	25.5	8,292	35.5	24.4	5,512	23.6	15.6	2,037	17.5	12.0	1,274	10.9	7.0
民國103年	9,253	39.5	25.6	8,253	35.3	23.5	5,866	25.1	16.0	2,151	18.4	12.4	1,286	11.0	6.8
民國104年	9,319	39.7	24.9	8,333	35.5	23.0	5,954	25.4	15.6	2,223	18.9	12.5	1,300	11.1	6.7
民國105年	9,460	40.2	24.6	8,429	35.8	22.4	5,990	25.5	15.3	2,260	19.1	12.2	1,422	12.1	7.2
民國106年	9,322	39.6	23.3	8,479	36.0	21.8	6,084	25.8	15.0	2,468	20.9	13.0	1,470	12.5	7.3
民國107年	9,476	40.2	23.0	8,297	35.2	20.5	6,096	25.9	14.6	2,511	21.2	12.9	1,454	12.4	7.0
民國108年	9,701	41.1	22.8	7,881	33.4	18.8	6,436	27.3	14.9	2,633	22.2	13.1	1,538	13.1	7.1
民國109年	9,629	40.8	21.8	7,773	33.0	18.0	6,489	27.5	14.6	2,655	22.3	12.8	1,730	14.8	7.8
民國110年	10,040	42.8	22.2	7,970	34.0	17.9	6,657	28.4	14.6	2,913	24.6	13.8	1,689	14.5	7.5
民國111年	10,053	43.1	21.8	7,781	33.4	17.0	6,853	29.4	14.7	2,834	24.1	13.1	1,830	15.9	8.0
轉換比值	1.0094	1.0094	1.0090	1.0091	1.0091	1.0087	1.0469	1.0469	1.0452	1.0385	1.0385	1.0368	1.0559	1.0559	1.0544
原發布數															
民國97年	7,777	33.8	26.3	7,651	33.3	26.8	4,266	18.5	14.4	1,541	13.5	10.7	892	7.7	5.7
民國98年	7,951	34.5	25.9	7,759	33.6	26.2	4,531	19.6	14.8	1,589	13.9	10.6	936	8.0	5.9
民國99年	8,194	35.4	25.8	7,744	33.5	25.2	4,676	20.2	14.6	1,706	14.8	11.0	1,021	8.8	6.1
民國100年	8,541	36.8	26.0	8,022	34.6	25.3	4,921	21.2	15.0	1,852	16.0	11.6	1,096	9.4	6.4
民國101年	8,587	36.9	25.4	8,116	34.9	24.7	5,131	22.0	14.9	1,912	16.5	11.6	1,187	10.2	6.7
民國102年	8,854	37.9	25.3	8,217	35.2	24.2	5,265	22.6	14.9	1,962	16.8	11.6	1,207	10.3	6.6
民國103年	9,167	39.2	25.3	8,178	34.9	23.3	5,603	23.9	15.3	2,071	17.7	11.9	1,218	10.4	6.5
民國104年	9,232	39.3	24.7	8,258	35.2	22.8	5,687	24.2	14.9	2,141	18.2	12.0	1,231	10.5	6.4
民國105年	9,372	39.9	24.4	8,353	35.5	22.2	5,722	24.3	14.6	2,176	18.4	11.8	1,347	11.5	6.8
民國106年	9,235	39.2	23.1	8,402	35.7	21.6	5,812	24.7	14.4	2,377	20.1	12.6	1,392	11.9	6.9
民國107年	9,388	39.8	22.8	8,222	34.9	20.3	5,823	24.7	14.0	2,418	20.4	12.5	1,377	11.8	6.6

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表4 歷年主要癌症死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	口腔癌			胰臟癌			胃癌			食道癌			卵巢癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	2,403	10.4	8.4	1,387	6.0	4.8	2,388	10.4	7.9	1,512	6.6	5.2	427	3.8	3.0
民國98年	2,436	10.6	8.3	1,505	6.5	5.0	2,377	10.3	7.6	1,572	6.8	5.3	452	3.9	3.0
民國99年	2,567	11.1	8.5	1,495	6.5	4.8	2,355	10.2	7.3	1,650	7.1	5.4	448	3.9	2.9
民國100年	2,668	11.5	8.6	1,634	7.0	5.0	2,384	10.3	7.1	1,591	6.9	5.0	459	4.0	2.9
民國101年	2,780	11.9	8.8	1,657	7.1	4.9	2,486	10.7	7.2	1,669	7.2	5.1	545	4.7	3.3
民國102年	2,918	12.5	8.9	1,829	7.8	5.3	2,335	10.0	6.5	1,752	7.5	5.2	576	4.9	3.4
民國103年	2,943	12.6	8.8	1,922	8.2	5.4	2,448	10.5	6.6	1,890	8.1	5.5	566	4.8	3.2
民國104年	2,889	12.3	8.4	1,981	8.4	5.4	2,423	10.3	6.3	1,907	8.1	5.4	546	4.6	3.0
民國105年	3,180	13.5	9.0	2,030	8.6	5.3	2,412	10.3	6.1	1,827	7.8	5.1	677	5.7	3.7
民國106年	3,079	13.1	8.5	2,117	9.0	5.4	2,400	10.2	5.8	1,897	8.1	5.1	665	5.6	3.5
民國107年	3,279	13.9	8.8	2,331	9.9	5.7	2,395	10.2	5.7	2,036	8.6	5.4	644	5.4	3.3
民國108年	3,425	14.5	8.9	2,497	10.6	5.9	2,379	10.1	5.5	1,983	8.4	5.1	683	5.7	3.5
民國109年	3,380	14.3	8.6	2,450	10.4	5.7	2,339	9.9	5.2	1,954	8.3	4.9	724	6.1	3.6
民國110年	3,395	14.5	8.5	2,659	11.3	6.0	2,310	9.8	5.0	2,030	8.6	5.0	696	5.9	3.3
民國111年	3,479	14.9	8.5	2,769	11.9	6.1	2,277	9.8	4.9	1,980	8.5	4.8	765	6.5	3.7
轉換比值	1.0833	1.0833	1.0832	1.0170	1.0170	1.0158	1.0418	1.0418	1.0386	1.0555	1.0555	1.0543	1.0321	1.0321	1.0303
原發布數															
民國97年	2,218	9.6	7.8	1,364	5.9	4.7	2,292	10.0	7.6	1,433	6.2	5.0	414	3.6	2.9
民國98年	2,249	9.7	7.6	1,480	6.4	4.9	2,282	9.9	7.3	1,489	6.5	5.0	438	3.8	2.9
民國99年	2,370	10.2	7.8	1,470	6.4	4.7	2,261	9.8	7.0	1,563	6.8	5.1	434	3.8	2.8
民國100年	2,463	10.6	7.9	1,607	6.9	4.9	2,288	9.9	6.8	1,507	6.5	4.7	445	3.9	2.8
民國101年	2,566	11.0	8.1	1,629	7.0	4.9	2,386	10.3	6.9	1,581	6.8	4.9	528	4.5	3.2
民國102年	2,694	11.5	8.2	1,798	7.7	5.2	2,241	9.6	6.2	1,660	7.1	5.0	558	4.8	3.3
民國103年	2,717	11.6	8.1	1,890	8.1	5.3	2,350	10.0	6.3	1,791	7.7	5.2	548	4.7	3.1
民國104年	2,667	11.4	7.8	1,948	8.3	5.3	2,326	9.9	6.1	1,807	7.7	5.1	529	4.5	3.0
民國105年	2,936	12.5	8.3	1,996	8.5	5.3	2,315	9.8	5.8	1,731	7.4	4.8	656	5.6	3.6
民國106年	2,842	12.1	7.8	2,082	8.8	5.3	2,304	9.8	5.6	1,797	7.6	4.8	644	5.4	3.4
民國107年	3,027	12.8	8.1	2,292	9.7	5.6	2,299	9.7	5.5	1,929	8.2	5.1	624	5.3	3.2

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表4 歷年主要癌症死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	非何杰金氏淋巴瘤			子宮頸及部位未明示子宮癌			白血病			膀胱癌			子宮體癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	925	4.0	3.2	747	6.6	4.9	907	3.9	3.3	737	3.2	2.4	172	1.5	1.2
民國98年	939	4.1	3.1	691	6.0	4.4	954	4.1	3.4	809	3.5	2.5	156	1.4	1.0
民國99年	1,018	4.4	3.2	741	6.4	4.6	1,000	4.3	3.4	786	3.4	2.4	196	1.7	1.3
民國100年	997	4.3	3.1	716	6.2	4.2	902	3.9	3.1	845	3.6	2.5	206	1.8	1.3
民國101年	1,043	4.5	3.1	704	6.1	4.1	975	4.2	3.2	863	3.7	2.4	201	1.7	1.2
民國102年	1,099	4.7	3.2	739	6.3	4.1	1,015	4.3	3.3	891	3.8	2.4	259	2.2	1.5
民國103年	1,138	4.9	3.2	673	5.7	3.6	1,021	4.4	3.2	940	4.0	2.4	297	2.5	1.7
民國104年	1,221	5.2	3.3	695	5.9	3.6	1,083	4.6	3.2	965	4.1	2.4	268	2.3	1.5
民國105年	1,203	5.1	3.2	667	5.7	3.4	1,130	4.8	3.3	957	4.1	2.3	332	2.8	1.8
民國106年	1,224	5.2	3.2	685	5.8	3.4	1,042	4.4	3.0	1,039	4.4	2.4	344	2.9	1.8
民國107年	1,207	5.1	3.0	687	5.8	3.4	1,132	4.8	3.2	1,071	4.5	2.4	409	3.4	2.1
民國108年	1,275	5.4	3.0	674	5.7	3.2	1,123	4.8	3.0	1,086	4.6	2.3	392	3.3	1.9
民國109年	1,294	5.5	3.0	668	5.6	3.1	1,176	5.0	3.0	1,065	4.5	2.2	444	3.7	2.2
民國110年	1,348	5.7	3.1	608	5.1	2.8	1,150	4.9	2.9	1,129	4.8	2.3	489	4.1	2.3
民國111年	1,390	6.0	3.1	608	5.2	2.7	1,176	5.0	2.9	1,145	4.9	2.3	480	4.1	2.2
轉換比值	1.0272	1.0272	1.0255	1.0521	1.0521	1.0448	1.0328	1.0328	1.0303	1.0699	1.0699	1.0691	1.0354	1.0354	1.0378
原發布數															
民國97年	900	3.9	3.1	710	6.2	4.7	878	3.8	3.2	689	3.0	2.2	166	1.5	1.2
民國98年	914	4.0	3.0	657	5.7	4.2	924	4.0	3.3	756	3.3	2.4	151	1.3	1.0
民國99年	991	4.3	3.2	704	6.1	4.4	968	4.2	3.3	735	3.2	2.2	189	1.6	1.2
民國100年	971	4.2	3.0	681	5.9	4.1	873	3.8	3.0	790	3.4	2.3	199	1.7	1.3
民國101年	1,015	4.4	3.0	669	5.8	3.9	944	4.1	3.1	807	3.5	2.3	194	1.7	1.2
民國102年	1,070	4.6	3.1	702	6.0	4.0	983	4.2	3.2	833	3.6	2.2	250	2.1	1.5
民國103年	1,108	4.7	3.1	640	5.5	3.4	989	4.2	3.1	879	3.8	2.3	287	2.5	1.6
民國104年	1,189	5.1	3.2	661	5.6	3.5	1,049	4.5	3.1	902	3.8	2.2	259	2.2	1.4
民國105年	1,171	5.0	3.1	634	5.4	3.3	1,094	4.7	3.2	894	3.8	2.2	321	2.7	1.7
民國106年	1,192	5.1	3.1	651	5.5	3.2	1,009	4.3	2.9	971	4.1	2.2	332	2.8	1.7
民國107年	1,175	5.0	2.9	653	5.5	3.2	1,096	4.6	3.1	1,001	4.2	2.2	395	3.3	2.0

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表5 歷年男性主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	氣管、支氣管和肺癌			肝和肝內膽管癌			結腸、直腸和肛門癌			口腔癌			食道癌		
	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率	死亡人數	死亡率	標準化死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	5,354	46.1	36.8	5,531	47.6	39.6	2,605	22.4	17.9	2,253	19.4	16.0	1,393	12.0	9.8
民國98年	5,384	46.3	35.8	5,515	47.4	38.3	2,691	23.1	18.1	2,279	19.6	15.8	1,445	12.4	9.9
民國99年	5,461	46.9	35.4	5,502	47.3	37.1	2,856	24.5	18.4	2,382	20.5	16.1	1,537	13.2	10.3
民國100年	5,791	49.8	36.6	5,683	48.8	37.3	3,020	25.9	19.1	2,502	21.5	16.5	1,493	12.8	9.7
民國101年	5,678	48.7	35.0	5,645	48.4	36.1	3,105	26.6	19.0	2,557	21.9	16.5	1,559	13.4	9.9
民國102年	5,764	49.4	34.5	5,699	48.8	35.2	3,223	27.6	19.3	2,715	23.2	17.0	1,623	13.9	10.0
民國103年	5,946	50.9	34.7	5,603	47.9	33.9	3,317	28.4	19.3	2,713	23.2	16.9	1,770	15.1	10.7
民國104年	5,937	50.7	33.8	5,635	48.1	33.2	3,374	28.8	19.0	2,650	22.6	16.0	1,773	15.1	10.5
民國105年	6,014	51.3	33.4	5,668	48.4	32.3	3,453	29.5	19.0	2,926	25.0	17.2	1,709	14.6	9.9
民國106年	5,889	50.3	31.8	5,800	49.5	32.0	3,464	29.6	18.5	2,865	24.4	16.4	1,751	14.9	9.8
民國107年	5,966	50.9	31.4	5,625	48.0	30.3	3,508	29.9	18.3	3,012	25.7	16.9	1,891	16.1	10.4
民國108年	6,190	52.9	31.6	5,363	45.8	28.1	3,661	31.3	18.6	3,154	26.9	17.3	1,841	15.7	9.9
民國109年	6,037	51.6	29.7	5,296	45.3	26.8	3,636	31.1	17.9	3,137	26.8	16.8	1,801	15.4	9.5
民國110年	6,335	54.5	30.7	5,411	46.5	26.8	3,816	32.8	18.4	3,110	26.7	16.5	1,869	16.1	9.7
民國111年	6,294	54.5	29.9	5,202	45.1	25.2	3,951	34.2	18.8	3,192	27.7	16.6	1,836	15.9	9.3
轉換比值	1.0090	1.0090	1.0086	1.0088	1.0088	1.0084	1.0503	1.0503	1.0498	1.0838	1.0838	1.0837	1.0552	1.0552	1.0542
原發布數															
民國97年	5,306	45.7	36.5	5,483	47.2	39.3	2,480	21.3	17.0	2,079	17.9	14.8	1,320	11.4	9.3
民國98年	5,336	45.9	35.5	5,467	47.0	38.0	2,562	22.0	17.2	2,103	18.1	14.6	1,369	11.8	9.4
民國99年	5,412	46.5	35.1	5,454	46.9	36.8	2,719	23.4	17.6	2,198	18.9	14.9	1,457	12.5	9.7
民國100年	5,740	49.3	36.3	5,633	48.4	37.0	2,875	24.7	18.2	2,308	19.8	15.2	1,415	12.2	9.2
民國101年	5,628	48.3	34.7	5,596	48.0	35.8	2,956	25.4	18.1	2,359	20.2	15.3	1,477	12.7	9.4
民國102年	5,713	48.9	34.2	5,649	48.4	34.9	3,069	26.3	18.3	2,505	21.4	15.7	1,538	13.2	9.5
民國103年	5,893	50.4	34.4	5,554	47.5	33.6	3,158	27.0	18.4	2,503	21.4	15.6	1,677	14.3	10.1
民國104年	5,884	50.3	33.5	5,586	47.7	32.9	3,212	27.4	18.1	2,445	20.9	14.8	1,680	14.4	9.9
民國105年	5,961	50.9	33.2	5,619	48.0	32.1	3,288	28.1	18.1	2,700	23.0	15.9	1,620	13.8	9.3
民國106年	5,837	49.8	31.6	5,749	49.1	31.8	3,298	28.1	17.6	2,643	22.6	15.2	1,659	14.2	9.3
民國107年	5,913	50.5	31.1	5,576	47.6	30.0	3,340	28.5	17.4	2,779	23.7	15.6	1,792	15.3	9.9

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表5 歷年男性主要癌症死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	前列腺(攝護腺)癌			胰臟癌			胃癌			非何杰金氏淋巴瘤			膀胱癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	942	8.1	6.1	806	6.9	5.7	1,590	13.7	10.7	575	4.9	4.0	502	4.3	3.3
民國98年	988	8.5	6.2	885	7.6	6.0	1,529	13.1	9.9	558	4.8	3.8	523	4.5	3.4
民國99年	1,078	9.3	6.5	869	7.5	5.7	1,517	13.0	9.6	647	5.6	4.2	538	4.6	3.3
民國100年	1,157	9.9	6.8	922	7.9	5.8	1,555	13.4	9.5	631	5.4	4.0	559	4.8	3.4
民國101年	1,253	10.7	7.1	950	8.2	5.9	1,576	13.5	9.4	623	5.3	3.8	562	4.8	3.2
民國102年	1,274	10.9	7.0	1,026	8.8	6.3	1,490	12.8	8.6	640	5.5	3.8	596	5.1	3.4
民國103年	1,286	11.0	6.8	1,030	8.8	6.1	1,611	13.8	9.0	678	5.8	4.0	638	5.5	3.5
民國104年	1,300	11.1	6.7	1,104	9.4	6.4	1,530	13.1	8.4	738	6.3	4.2	645	5.5	3.4
民國105年	1,422	12.1	7.2	1,125	9.6	6.4	1,491	12.7	8.0	712	6.1	4.0	635	5.4	3.3
民國106年	1,470	12.5	7.3	1,158	9.9	6.4	1,529	13.0	7.9	730	6.2	4.0	678	5.8	3.4
民國107年	1,454	12.4	7.0	1,240	10.6	6.6	1,453	12.4	7.4	718	6.1	3.9	704	6.0	3.5
民國108年	1,538	13.1	7.1	1,360	11.6	7.0	1,436	12.3	7.2	735	6.3	3.8	711	6.1	3.4
民國109年	1,730	14.8	7.8	1,349	11.5	6.8	1,433	12.3	6.9	748	6.4	3.8	712	6.1	3.3
民國110年	1,689	14.5	7.5	1,442	12.4	7.1	1,419	12.2	6.7	754	6.5	3.7	761	6.5	3.5
民國111年	1,830	15.9	8.0	1,465	12.7	7.0	1,391	12.1	6.5	815	7.1	4.0	751	6.5	3.4
轉換比值	1.0559	1.0559	1.0544	1.0164	1.0164	1.0159	1.0491	1.0491	1.0458	1.0301	1.0301	1.0247	1.0683	1.0683	1.0645
原發布數															
民國97年	892	7.7	5.7	793	6.8	5.6	1,516	13.0	10.2	558	4.8	3.9	470	4.0	3.1
民國98年	936	8.0	5.9	871	7.5	5.9	1,457	12.5	9.5	542	4.7	3.7	490	4.2	3.2
民國99年	1,021	8.8	6.1	855	7.3	5.6	1,446	12.4	9.2	628	5.4	4.1	504	4.3	3.1
民國100年	1,096	9.4	6.4	907	7.8	5.7	1,482	12.7	9.1	613	5.3	4.0	523	4.5	3.2
民國101年	1,187	10.2	6.7	935	8.0	5.8	1,502	12.9	9.0	605	5.2	3.7	526	4.5	3.1
民國102年	1,207	10.3	6.6	1,009	8.6	6.2	1,420	12.2	8.3	621	5.3	3.7	558	4.8	3.2
民國103年	1,218	10.4	6.5	1,013	8.7	6.0	1,536	13.1	8.6	658	5.6	3.9	597	5.1	3.3
民國104年	1,231	10.5	6.4	1,086	9.3	6.3	1,458	12.5	8.0	716	6.1	4.1	604	5.2	3.2
民國105年	1,347	11.5	6.8	1,107	9.4	6.3	1,421	12.1	7.6	691	5.9	3.9	594	5.1	3.1
民國106年	1,392	11.9	6.9	1,139	9.7	6.3	1,457	12.4	7.6	709	6.0	3.9	635	5.4	3.2
民國107年	1,377	11.8	6.6	1,220	10.4	6.5	1,385	11.8	7.1	697	5.9	3.8	659	5.6	3.3

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表5 歷年男性主要癌症死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	白血病			鼻咽癌			腎臟癌			腦癌			膽囊和其他膽道癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	528	4.5	3.9	620	5.3	4.4	275	2.4	1.9	233	2.0	1.7	308	2.6	2.2
民國98年	589	5.1	4.2	555	4.8	3.9	303	2.6	2.0	260	2.2	2.0	331	2.8	2.2
民國99年	600	5.2	4.2	533	4.6	3.7	302	2.6	1.9	289	2.5	2.1	290	2.5	1.9
民國100年	552	4.7	3.8	602	5.2	4.0	322	2.8	2.0	299	2.6	2.2	306	2.6	2.0
民國101年	598	5.1	4.0	547	4.7	3.5	307	2.6	1.9	286	2.4	2.0	271	2.3	1.7
民國102年	601	5.1	3.9	563	4.8	3.6	320	2.7	2.0	318	2.7	2.1	292	2.5	1.7
民國103年	577	4.9	3.7	563	4.8	3.5	306	2.6	1.8	314	2.7	2.2	300	2.6	1.8
民國104年	639	5.5	4.0	640	5.5	3.9	301	2.6	1.7	310	2.6	2.1	336	2.9	1.9
民國105年	645	5.5	3.8	562	4.8	3.4	368	3.1	2.1	318	2.7	2.1	294	2.5	1.6
民國106年	614	5.2	3.7	516	4.4	3.0	341	2.9	1.8	336	2.9	2.1	291	2.5	1.6
民國107年	656	5.6	4.0	532	4.5	3.0	396	3.4	2.1	336	2.9	2.1	285	2.4	1.5
民國108年	653	5.6	3.7	536	4.6	3.0	379	3.2	1.9	363	3.1	2.2	339	2.9	1.7
民國109年	717	6.1	3.9	487	4.2	2.6	334	2.9	1.7	360	3.1	2.1	312	2.7	1.6
民國110年	678	5.8	3.7	522	4.5	2.8	355	3.1	1.7	319	2.7	1.9	313	2.7	1.5
民國111年	667	5.8	3.5	504	4.4	2.7	381	3.3	1.8	327	2.8	2.0	286	2.5	1.3
轉換比值	1.0314	1.0314	1.0299	1.0556	1.0556	1.0547	1.0449	1.0449	1.0413	1.0090	1.0090	1.0037	1.0252	1.0252	1.0290
原發布數															
民國97年	512	4.4	3.8	587	5.1	4.2	263	2.3	1.8	231	2.0	1.7	300	2.6	2.1
民國98年	571	4.9	4.1	526	4.5	3.7	290	2.5	2.0	258	2.2	2.0	323	2.8	2.2
民國99年	582	5.0	4.1	505	4.3	3.5	289	2.5	1.9	286	2.5	2.1	283	2.4	1.8
民國100年	535	4.6	3.7	570	4.9	3.8	308	2.6	1.9	296	2.5	2.2	298	2.6	1.9
民國101年	580	5.0	3.9	518	4.4	3.4	294	2.5	1.8	283	2.4	2.0	264	2.3	1.7
民國102年	583	5.0	3.8	533	4.6	3.4	306	2.6	1.9	315	2.7	2.1	285	2.4	1.7
民國103年	559	4.8	3.6	533	4.6	3.3	293	2.5	1.7	311	2.7	2.2	293	2.5	1.7
民國104年	620	5.3	3.9	606	5.2	3.7	288	2.5	1.7	307	2.6	2.1	328	2.8	1.9
民國105年	625	5.3	3.7	532	4.5	3.2	352	3.0	2.0	315	2.7	2.1	287	2.4	1.5
民國106年	595	5.1	3.6	489	4.2	2.9	326	2.8	1.7	333	2.8	2.1	284	2.4	1.5
民國107年	636	5.4	3.8	504	4.3	2.9	379	3.2	2.0	333	2.8	2.1	278	2.4	1.4

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表6 歷年女性主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口

年 別	氣管、支氣管和肺癌			結腸、直腸和肛門癌			女性乳癌			肝和肝內膽管癌			胰臟癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	2,496	21.9	16.7	1,861	16.4	12.3	1,600	14.1	11.1	2,190	19.2	14.9	581	5.1	3.9
民國98年	2,642	23.1	17.0	2,052	17.9	13.0	1,650	14.4	11.0	2,315	20.2	15.0	620	5.4	4.0
民國99年	2,810	24.4	17.2	2,039	17.7	12.4	1,772	15.4	11.4	2,313	20.1	14.3	626	5.4	3.9
民國100年	2,830	24.5	16.7	2,132	18.5	12.4	1,923	16.6	12.0	2,412	20.9	14.4	712	6.2	4.2
民國101年	2,989	25.7	17.1	2,267	19.5	12.5	1,986	17.1	12.0	2,545	21.9	14.5	707	6.1	4.0
民國102年	3,173	27.2	17.5	2,289	19.6	12.3	2,037	17.5	12.0	2,593	22.2	14.2	803	6.9	4.4
民國103年	3,307	28.2	17.5	2,549	21.8	13.1	2,151	18.4	12.4	2,650	22.6	13.9	892	7.6	4.7
民國104年	3,382	28.8	17.2	2,580	21.9	12.7	2,223	18.9	12.5	2,698	22.9	13.6	877	7.5	4.4
民國105年	3,446	29.2	16.9	2,537	21.5	12.0	2,260	19.1	12.2	2,761	23.4	13.3	905	7.7	4.4
民國106年	3,433	29.0	16.0	2,620	22.1	12.0	2,468	20.9	13.0	2,679	22.6	12.4	959	8.1	4.5
民國107年	3,510	29.6	15.9	2,588	21.8	11.5	2,511	21.2	12.9	2,672	22.5	11.7	1,091	9.2	4.9
民國108年	3,511	29.5	15.3	2,775	23.3	11.8	2,633	22.2	13.1	2,518	21.2	10.5	1,137	9.6	5.0
民國109年	3,592	30.2	15.1	2,853	24.0	11.8	2,655	22.3	12.8	2,477	20.8	10.0	1,101	9.3	4.7
民國110年	3,705	31.3	15.0	2,841	24.0	11.3	2,913	24.6	13.8	2,559	21.6	10.0	1,217	10.3	5.0
民國111年	3,759	31.9	14.9	2,902	24.6	11.2	2,834	24.1	13.1	2,579	21.9	9.6	1,304	11.1	5.2
轉換比值	1.0101	1.0101	1.0097	1.0423	1.0423	1.0393	1.0385	1.0385	1.0368	1.0098	1.0098	1.0095	1.0177	1.0177	1.0160
原發布數															
民國97年	2,471	21.7	16.5	1,786	15.7	11.8	1,541	13.5	10.7	2,168	19.1	14.7	571	5.0	3.8
民國98年	2,615	22.8	16.9	1,969	17.2	12.5	1,589	13.9	10.6	2,292	20.0	14.9	609	5.3	3.9
民國99年	2,782	24.2	17.1	1,957	17.0	11.9	1,706	14.8	11.0	2,290	19.9	14.2	615	5.3	3.8
民國100年	2,801	24.2	16.5	2,046	17.7	11.9	1,852	16.0	11.6	2,389	20.7	14.3	700	6.1	4.1
民國101年	2,959	25.5	17.0	2,175	18.7	12.1	1,912	16.5	11.6	2,520	21.7	14.4	694	6.0	4.0
民國102年	3,141	26.9	17.3	2,196	18.8	11.9	1,962	16.8	11.6	2,568	22.0	14.1	789	6.8	4.3
民國103年	3,274	28.0	17.3	2,445	20.9	12.6	2,071	17.7	11.9	2,624	22.4	13.8	877	7.5	4.6
民國104年	3,348	28.5	17.0	2,475	21.0	12.2	2,141	18.2	12.0	2,672	22.7	13.4	862	7.3	4.4
民國105年	3,411	28.9	16.7	2,434	20.6	11.6	2,176	18.4	11.8	2,734	23.2	13.2	889	7.5	4.3
民國106年	3,398	28.7	15.9	2,514	21.2	11.6	2,377	20.1	12.6	2,653	22.4	12.3	943	8.0	4.4
民國107年	3,475	29.3	15.7	2,483	20.9	11.0	2,418	20.4	12.5	2,646	22.3	11.6	1,072	9.0	4.8

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表6 歷年女性主要癌症死亡原因(續1)

單位：人、每十萬人口

年 別	胃癌			卵巢癌			子宮頸及部位未明示子宮癌			非何杰金氏淋巴瘤			白血病		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	798	7.0	5.3	427	3.8	3.0	747	6.6	4.9	350	3.1	2.4	379	3.3	2.8
民國98年	848	7.4	5.3	452	3.9	3.0	691	6.0	4.4	381	3.3	2.5	365	3.2	2.6
民國99年	838	7.3	5.1	448	3.9	2.9	741	6.4	4.6	371	3.2	2.3	400	3.5	2.7
民國100年	829	7.2	4.8	459	4.0	2.9	716	6.2	4.2	366	3.2	2.2	350	3.0	2.3
民國101年	910	7.8	5.1	545	4.7	3.3	704	6.1	4.1	420	3.6	2.5	377	3.2	2.5
民國102年	845	7.3	4.5	576	4.9	3.4	739	6.3	4.1	459	3.9	2.6	414	3.5	2.7
民國103年	837	7.2	4.4	566	4.8	3.2	673	5.7	3.6	460	3.9	2.5	444	3.8	2.7
民國104年	893	7.6	4.4	546	4.6	3.0	695	5.9	3.6	483	4.1	2.5	444	3.8	2.5
民國105年	921	7.8	4.4	677	5.7	3.7	667	5.7	3.4	491	4.2	2.5	485	4.1	2.8
民國106年	871	7.4	4.1	665	5.6	3.5	685	5.8	3.4	494	4.2	2.4	428	3.6	2.3
民國107年	942	7.9	4.2	644	5.4	3.3	687	5.8	3.4	489	4.1	2.2	476	4.0	2.5
民國108年	943	7.9	4.0	683	5.7	3.5	674	5.7	3.2	540	4.5	2.3	470	4.0	2.3
民國109年	906	7.6	3.8	724	6.1	3.6	668	5.6	3.1	546	4.6	2.3	459	3.9	2.2
民國110年	891	7.5	3.6	696	5.9	3.3	608	5.1	2.8	594	5.0	2.5	472	4.0	2.3
民國111年	886	7.5	3.5	765	6.5	3.7	608	5.2	2.7	575	4.9	2.3	509	4.3	2.5
轉換比值	1.0306	1.0306	1.0284	1.0321	1.0321	1.0303	1.0521	1.0521	1.0448	1.0230	1.0230	1.0286	1.0348	1.0348	1.0316
原發布數															
民國97年	776	6.8	5.1	414	3.6	2.9	710	6.2	4.7	342	3.0	2.3	366	3.2	2.7
民國98年	825	7.2	5.2	438	3.8	2.9	657	5.7	4.2	372	3.2	2.4	353	3.1	2.5
民國99年	815	7.1	4.9	434	3.8	2.8	704	6.1	4.4	363	3.2	2.2	386	3.4	2.7
民國100年	806	7.0	4.7	445	3.9	2.8	681	5.9	4.1	358	3.1	2.1	338	2.9	2.2
民國101年	884	7.6	5.0	528	4.5	3.2	669	5.8	3.9	410	3.5	2.4	364	3.1	2.4
民國102年	821	7.0	4.4	558	4.8	3.3	702	6.0	4.0	449	3.8	2.5	400	3.4	2.6
民國103年	814	6.9	4.3	548	4.7	3.1	640	5.5	3.4	450	3.8	2.4	430	3.7	2.6
民國104年	868	7.4	4.3	529	4.5	3.0	661	5.6	3.5	473	4.0	2.5	429	3.6	2.4
民國105年	894	7.6	4.3	656	5.6	3.6	634	5.4	3.3	480	4.1	2.4	469	4.0	2.7
民國106年	847	7.2	3.9	644	5.4	3.4	651	5.5	3.2	483	4.1	2.4	414	3.5	2.3
民國107年	914	7.7	4.1	624	5.3	3.2	653	5.5	3.2	478	4.0	2.1	460	3.9	2.4

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。

附表6 歷年女性主要癌症死亡原因(續完)

單位：人、每十萬人口

年 別	子宮體癌			膀胱癌			膽囊和其他膽道癌			口腔癌			間皮和軟組織癌		
	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率	死亡 人數	死亡率	標準化 死亡率
經轉換比值調整後值															
民國97年	172	1.5	1.2	235	2.1	1.5	253	2.2	1.7	150	1.3	1.0	152	1.3	1.1
民國98年	156	1.4	1.0	286	2.5	1.8	305	2.7	1.9	157	1.4	1.0	129	1.1	0.9
民國99年	196	1.7	1.3	248	2.2	1.5	252	2.2	1.6	185	1.6	1.2	121	1.1	0.8
民國100年	206	1.8	1.3	286	2.5	1.7	256	2.2	1.5	166	1.4	1.0	155	1.3	1.0
民國101年	201	1.7	1.2	301	2.6	1.6	304	2.6	1.7	223	1.9	1.3	158	1.4	1.0
民國102年	259	2.2	1.5	295	2.5	1.5	262	2.2	1.4	203	1.7	1.2	162	1.4	0.9
民國103年	297	2.5	1.7	302	2.6	1.5	280	2.4	1.5	230	2.0	1.2	196	1.7	1.2
民國104年	268	2.3	1.5	320	2.7	1.5	299	2.5	1.5	239	2.0	1.2	193	1.6	1.1
民國105年	332	2.8	1.8	322	2.7	1.5	287	2.4	1.4	254	2.2	1.3	192	1.6	1.1
民國106年	344	2.9	1.8	361	3.0	1.5	295	2.5	1.4	214	1.8	1.1	212	1.8	1.2
民國107年	409	3.4	2.1	367	3.1	1.5	278	2.3	1.2	267	2.3	1.3	223	1.9	1.1
民國108年	392	3.3	1.9	375	3.2	1.5	278	2.3	1.2	271	2.3	1.2	234	2.0	1.2
民國109年	444	3.7	2.2	353	3.0	1.3	314	2.6	1.3	243	2.0	1.1	247	2.1	1.2
民國110年	489	4.1	2.3	368	3.1	1.3	307	2.6	1.2	285	2.4	1.2	256	2.2	1.3
民國111年	480	4.1	2.2	394	3.3	1.4	306	2.6	1.2	287	2.4	1.2	274	2.3	1.2
轉換比值	1.0354	1.0354	1.0378	1.0731	1.0731	1.0767	1.0221	1.0221	1.0231	1.0766	1.0766	1.0794	1.0183	1.0183	1.0164
原發布數															
民國97年	166	1.5	1.2	219	1.9	1.4	248	2.2	1.7	139	1.2	0.9	149	1.3	1.1
民國98年	151	1.3	1.0	266	2.3	1.6	298	2.6	1.9	146	1.3	0.9	127	1.1	0.9
民國99年	189	1.6	1.2	231	2.0	1.4	246	2.1	1.5	172	1.5	1.1	119	1.0	0.8
民國100年	199	1.7	1.3	267	2.3	1.5	251	2.2	1.5	155	1.3	0.9	152	1.3	1.0
民國101年	194	1.7	1.2	281	2.4	1.5	298	2.6	1.7	207	1.8	1.2	155	1.3	1.0
民國102年	250	2.1	1.5	275	2.4	1.4	256	2.2	1.4	189	1.6	1.1	159	1.4	0.9
民國103年	287	2.5	1.6	282	2.4	1.4	274	2.3	1.4	214	1.8	1.1	192	1.6	1.1
民國104年	259	2.2	1.4	298	2.5	1.4	292	2.5	1.4	222	1.9	1.1	190	1.6	1.1
民國105年	321	2.7	1.7	300	2.5	1.3	281	2.4	1.4	236	2.0	1.2	189	1.6	1.1
民國106年	332	2.8	1.7	336	2.8	1.4	288	2.4	1.3	199	1.7	1.0	208	1.8	1.1
民國107年	395	3.3	2.0	342	2.9	1.4	272	2.3	1.2	248	2.1	1.2	219	1.8	1.1

附註：1. 標準化死亡率係以2000年WHO之世界標準人口數為準。

2. 108年起死因統計改採「2016年版ICD-10死因選取準則」，並以相同標準計算107年資料，兩者比值稱「轉換比值」。

3. 97-106年「經轉換比值調整後值」係將原發布數乘上「轉換比值」回推，以呈現相同基礎下之變動情形，惟選取標準會隨醫學進步及疾病型態多元或有更迭，故不建議回推過長之時間數列資料。